

Paciente de 50 anos em pós-operatório de cirurgia abdominal, consciente, orientado, volume de líquido infundido de 3.000 ml drenagem pela sonda nasogástrica (2.000mL/24 h), diurese de 1.200 ml nas primeiras 12 horas. Nas últimas 4 horas, vem apresentando menos 8 mmHg de pressão venosa central.

01. O balanço hídrico das 12 horas é

- A) -200. B) +200. C) -150. D) +150. E) 300.

02. Quanto ao balanço hídrico e à mensuração da pressão venosa central nesse paciente, é CORRETO afirmar que o

- I.** valor da pressão venosa central está dentro do limite normal.
II. balanço hídrico e a mensuração da pressão venosa central sugerem que o paciente encontra-se hipovolêmico.
III. balanço hídrico e a mensuração da pressão venosa central são parâmetros seguros para monitorização de pacientes graves.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) todas .

03. Nas situações de emergências cardiológicas, o procedimento utilizado para diagnóstico das patologias cardíacas é

- A) monitor cardíaco.
B) eletrocardiograma.
C) monitorização de pressão arterial média.
D) monitorização de pressão venosa central.
E) monitorização da saturação de oxigênio.

04. Analise as afirmativas abaixo e assinale V (verdadeiro) e F (falso).

- () O dispositivo bolsa válvula e máscara é um dispositivo utilizado para ventilar e oxigenar, exclusivamente, pacientes em parada respiratória.
() O dispositivo bolsa válvula e máscara de inaloterapia devem ser de tamanho adequado para a idade e para o peso do paciente.
() A máscara laríngea é um dispositivo acessório para as vias aéreas, sendo indicada em situações de emergência.
() A ventilação não invasiva com pressão positiva é aplicada à via aérea do paciente. Tem como contra-indicação absoluta pós-operatório recente de cirurgia esofágica ou gástrica.
() Na sala de trauma, a cricotireostomia por punção é o procedimento de escolha para todos os casos, em que está contraindicada a intubação orotraqueal, intubação nasotraqueal e traqueostomia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F,F,V,V,V. B) F,V,V,V,V. C) V,F,F,F,V. D) F,V,V,V,F. E) F,V,V,V,F.

05. Um goleiro, durante uma partida de futebol, ao defender uma bola, engasgou-se com a prótese dentária de quatro dentes. A prioridade no atendimento da vítima deverá ser:

- A) manobras de Hemilich.
B) manobras rebaixamento da mandíbula.
C) manobras de elevação do mento.
D) manter a posição neutra.
E) hiperextensão da cabeça da vítima.

06. Em relação à administração de medicamentos, analise as afirmações abaixo.

- I.** É importante observar reações colaterais, como consequência de uma medicação (náuseas, vômitos, diarreia, por exemplo), apenas em medicamentos administrados por via endovenosa.
II. Os cinco passos certos para administração medicamentosa são: medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo e paciente certo.
III. Não é considerada via de administração parentérica: via subcutânea.

Assinale a alternativa que apresenta a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- A) I apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e III. E) II e III.

07. Em relação à cateterização vesical, é CORRETO afirmar que

- A) para a instalação de uma sonda vesical, uma sonda de demora, deve-se utilizar sistema de drenagem fechado ou aberto.
- B) as principais indicações para drenagem suprapúbica são quando há necessidade de uso crônico da sonda ou no trauma de uretra.
- C) para as sondagens de alívio ou de demora, os cateteres mais utilizados são a sonda de nelaton.
- D) antes da instalação do cateterismo vesical, não é necessária a lavagem das mãos, visto que o profissional irá calçar luvas estéreis.
- E) para lavagem vesical, usam-se, preferencialmente, os cateteres de duas vias.

08. São objetivos da sondagem gástrica, EXCETO:

- A) compressão gástrica.
- B) administrar medicamentos e alimentos.
- C) obter conteúdo gástrico para análise.
- D) diagnosticar a motilidade intestinal.
- E) administrar alimentos.

09. São considerados fatores extrínsecos (sistêmicos) que influenciam no processo de cicatrização:

- A) idade, tabagismo, doenças crônicas e alterações nutricionais.
- B) ressecamento da ferida, tecido necrótico; idade e tabagismo.
- C) idade, tabagismo, doenças crônicas, edema e alterações nutricionais.
- D) doenças crônicas, ressecamento da ferida e alterações nutricionais.
- E) hematoma, edema, ressecamento da ferida, corpo estranho e tecido necrótico.

10. O termo de Queiloplastia refere-se a(à)

- A) reparo de defeito nos lábios.
- B) correção cirúrgica de rugas de face.
- C) sutura de pálpebras.
- D) remoção de fístula.
- E) elevação e fixação da bexiga.

11. O termo TAQUIPNEIA significa

- A) respiração difícil, trabalhosa e curta.
- B) respiração rápida, acima da normalidade.
- C) respiração lenta, abaixo da normalidade.
- D) ausência de respiração.
- E) incapacidade de respirar facilmente, exceto em posição ereta.

12. São consideradas vacinas que fazem parte do esquema básico do Programa Nacional de Imunização, EXCETO

- A) SRC (Sarampo, Rubéola e Caxumba).
- B) Febre amarela.
- C) VORH (*Vacina Oral de Rotavírus Humano*).
- D) Vacina contra hepatite B.
- E) Vacina contra varicela.

13. Segundo a Portaria N° 2048, de 5 de novembro de 2002, são consideradas ambulâncias, veículos terrestres, aéreos ou aquaviários, que se destinam, exclusivamente, ao transporte de enfermos. As ambulâncias são classificadas em ambulâncias tipos:

- A) A, B e C.
- B) B, C e D.
- C) A, B, C e D.
- D) A, B, C, D e E.
- E) A, B, C, D, E e F.

14. Segundo a Portaria N° 2048, de 5 de novembro de 2002, analise as afirmativas abaixo.

- I. O atendimento pré-hospitalar pode ser fixo e móvel.*
- II. No atendimento pré-hospitalar móvel, os bombeiros são considerados profissionais oriundos da saúde.*
- III. Para ingressar no serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, é necessário participar de um curso de atendimento pré-hospitalar móvel com certificação.*

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I.
- B) II.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) todas.

15. São consideradas emergências hipertensivas:

- A) pré-eclâmpsia, eclâmpsia, encefalopatia hipertensiva.
- B) angina instável, pré-eclâmpsia e infarto agudo do miocárdio.
- C) aneurisma de aorta, pré-eclâmpsia e encefalopatia hipertensiva.
- D) aneurisma de aorta, eclâmpsia e encefalopatia hipertensiva.
- E) angina estável, eclâmpsia e angina instável.

16. Segundo American Heart Association e American Academy of Pediatrics, se o neonato não respirar imediatamente, a estimulação tátil pode ser realizada. As ações que devem ser utilizadas para a estimulação tátil durante reanimação são:

- A) palmadas ou piparotes na sola do pé ou palmadas no dorso.
- B) compressão da caixa torácica ou palmadas no dorso.
- C) usar compressas quentes ou frias ou colocar oxigênio ou ar frio próximo à face ou ao corpo do paciente.
- D) dilatação do esfíncter anal ou forçar as coxas contra o abdome.
- E) palmadas ou piparotes na sola do pé ou fricção no dorso do paciente.

17. Analise as afirmativas abaixo e assinale V (verdadeiro) e F (falso).

- () *Antes da coleta de hemoculturas, deve-se higienizar as mãos.*
- () *Para a coleta de hemoculturas, as veias, preferencialmente, são do dorso das mãos e prega ulnar, pois, são locais com menor colonização da pele.*
- () *As venopunções deverão ser realizadas no mesmo local, com intervalo de tempo diferente.*
- () *Após realizar antisepsia para coleta de hemocultura, deve-se calçar luvas de procedimento para venopunção.*
- () *Deve-se coletar, no mínimo, duas amostras de hemocultura (total de 2 frascos).*

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V, F, F, F, V. B) V, F, V, V, V. C) V, F, V, F, F. D) V, V, F, F, V. E) V, F, V, V, V.

18. A posição de Trendelenburg reversa é utilizada nas cirurgias

- A) pélvicas. B) de face. C) ginecológicas. D) de abdome inferior. E) de abdome superior.

19. São fatores de risco para câncer cervico-uterino, EXCETO:

- A) início precoce da atividade sexual e Vírus do Papiloma Humano (HPV).
- B) multiplicidade de parceiros sexuais e higiene íntima inadequada.
- C) tabagismo e uso prolongado de contraceptivos orais.
- D) Vírus do Papiloma Humano (HPV) e Vírus da Imunodeficiência Humana.
- E) Vírus do Papiloma Humano (HPV) e uso prolongado de contraceptivos orais.

20. O Desfibrilador Automático Externo – DEA é utilizado para reverter

- A) Taquicardia ventricular.
- B) Bradicardia sinusal.
- C) Taquicardia paroxística supraventricular.
- D) Bloqueios átrio-ventriculares.
- E) Assistolia.