

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM
CONCURSO PÚBLICO**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

NOME

Nº DE IDENT.	ORG. EXP.	UF	Nº DE INSCRIÇÃO

PRÉDIO	SALA

MÉDICO / ULTRASSONOGRAFISTA

ATENÇÃO

- ✓ *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- ✓ *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 de Conhecimentos Gerais, 10 (dez) de Conhecimentos do SUS e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos.*
- ✓ *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- ✓ *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- ✓ *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- ✓ *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- ✓ *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.*

CONHECIMENTOS GERAIS

01. “A ninguém darei, para agradar, remédio mortal nem conselho para induzir à perdição”.

Considerando o juramento de Hipócrates, os conceitos e a legislação brasileira sobre a eutanásia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A eutanásia voluntária ocorre, quando, a pedido do próprio paciente, se induz ou fornece meios para o chamado suicídio assistido.
- B) A eutanásia involuntária ocorre, quando não se tem a manifestação de vontade do paciente, mas, sim, a autorização dos familiares.
- C) A ortotanásia ou eutanásia passiva é modalidade hoje expressamente permitida no código penal brasileiro.
- D) A persistência ou obstinação terapêutica em paciente irrecuperável está associada à distanásia.
- E) A resolução 1805/2006 do Conselho Federal de Medicina versa sobre a terminalidade da vida e defende a ortotanásia na prática médica.

02. “Também não darei a uma mulher pessário abortivo”. Hipócrates.

Assinale a alternativa que melhor define o aborto em menor incapaz, vítima de violência sexual, quando autorizado pela mãe.

- A) Aborto criminoso.
- B) Aborto eugênico.
- C) Aborto social.
- D) Aborto seletivo.
- E) Aborto legal.

03. “Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém”. Hipócrates.

Considerando os direitos dos médicos previstos no código de ética médica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.
- B) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente.
- C) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- D) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
- E) Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo provável dos procedimentos propostos, quando solicitado.

04. “Conservarei puras minha vida e minha arte”. Hipócrates.

Considerando o Código de Ética Médica, assinale a alternativa INCORRETA quanto às vedações abaixo dispostas.

- A) É vedado ao médico anunciar títulos científicos que não possa comprovar ou especialidade para a qual não esteja qualificado.
- B) É vedado ao médico recusar a realização de atos médicos que, permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) É vedado ao médico realizar pesquisa médica em voluntários, sadios ou não, que tenham direta ou indiretamente dependência ou subordinação relativamente ao pesquisador.
- D) É vedado ao médico realizar pesquisa médica em ser humano, sem submeter o protocolo à aprovação e ao comportamento de comissão isenta de qualquer dependência em relação ao pesquisador.
- E) É vedado ao médico dar consulta, diagnóstico ou prescrição por intermédio de qualquer veículo de comunicação de massa.

05. Assinale a alternativa que apresenta a definição de Negligência Médica.

- A) É a falta de observação das normas por insuficiência de conhecimentos técnicos.
- B) É o ato comissivo característico da insensatez.
- C) Caracteriza-se pela ação sem a cautela necessária.
- D) Caracteriza-se pela falta de observância aos deveres que as circunstâncias exigem; é ato omissivo.
- E) É o acidente imprevisível ou resultado incontrolável.

06. Qual aspecto propedêutico abaixo é o mais importante para o diagnóstico da irritação peritoneal?

- A) Ausculta abdominal.
- B) Palpação do abdome.
- C) Descrição da dor abdominal.
- D) Inspeção geral do paciente.
- E) Inspeção do abdome.

07. Assinale a alternativa que NÃO contém fármaco com ação betabloqueadora do tipo Beta- 1 seletivo.

- A) Esmolol.
- B) Bisoprolol.
- C) Metoprolol.
- D) Atenolol.
- E) Propranolol.

08. Assinale a alternativa que NÃO contém fármaco hipoglicemiante oral.

- A) Glucagon.
- B) Metformina.
- C) Glibenclamida.
- D) Clorpropamida.
- E) Glimepirida.

09. Sobre o programa de controle do tabagismo no Brasil, é INCORRETO afirmar que

- A) no Brasil, estima-se que cerca de 200.000 mortes/ano são decorrentes do tabagismo (OPAS, 2002).
- B) se define tabagismo passivo como a inalação da fumaça de derivados do tabaco (cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros produtores de fumaça) por indivíduos não-fumantes, que convivem com fumantes em ambientes fechados.
- C) a fumaça dos derivados do tabaco em ambientes fechados é denominada poluição tabagística ambiental (PTA) e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), torna-se ainda mais grave em ambientes fechados.
- D) pesquisas mostram que a absorção da fumaça do cigarro por bebês que convivem em ambientes fechados com fumantes não incrementou o risco de Síndrome da morte súbita infantil.
- E) o tabagismo passivo é a 3ª maior causa de morte evitável no mundo, subsequente ao tabagismo ativo e ao consumo excessivo de álcool.

10. Sobre as medidas preventivas para a infecção pelo INFLUENZA A (H1N1), segundo recomendação do Ministério da Saúde do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Recomenda-se lavar bem as mãos frequentemente, com água e sabão.
- B) Deve-se evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies.
- C) Não se deve compartilhar objetos de uso pessoal.
- D) Recomenda-se a administração do fosfato de oseltamivir nas primeiras 48 horas após a confirmação da doença.
- E) Deve-se cobrir a boca e o nariz com lenço descartável, ao tossir ou espirrar.

CONHECIMENTOS DO SUS

11. Com relação ao processo de transição epidemiológica, é INCORRETO afirmar que

- A) uma de suas características é o deslocamento da maior carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens para os grupos mais idosos.
- B) nele existe a substituição, entre as primeiras causas de morte, das doenças infecciosas por doenças não transmissíveis.
- C) se modifica o perfil de saúde da população e os processos agudos que “se resolvem” rapidamente por meio da cura ou do óbito que passam a predominar.
- D) o processo gera a necessidade de readequação dos programas de saúde.
- E) a queda inicial da mortalidade concentra-se seletivamente, entre as doenças infecciosas e tende a beneficiar os grupos mais jovens da população.

12. A Organização Mundial de Saúde define Sistema de Informação em Saúde como um mecanismo de

- A) coleta e processamento da informação necessária para se operar e avaliar os serviços de saúde.
- B) análise e transmissão da informação necessária para se planejarem os serviços de saúde.
- C) coleta e análise da informação necessária para se organizar e avaliar os serviços de saúde.
- D) processamento e análise da informação necessária para se planejar e operar os serviços de saúde.
- E) coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde.

13. Várias são as justificativas apontadas para a pouca utilização das informações geradas pelo sistema de informação em saúde, no processo de decisão e controle. Com relação a elas, leia os itens abaixo.

- I. A falta de padronização nos procedimentos de obtenção, análise e disseminação dessas informações.*
II. A inexistência de instâncias responsáveis pela análise dos dados, mesmo havendo recursos humanos qualificados para apoiar o processo de desenvolvimento e análise desse sistema.
III. A complexidade dos dados existentes e da estrutura dos bancos.

Está(ão) **CORRETO(S)**

- A) I e III, apenas. B) I e II, apenas. C) II e III, apenas. D) I, II e III. E) I, apenas.

14. Com relação à participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, é **CORRETO** afirmar que a(o)

- A) necessidade de complementação de serviços deve ser aprovada pelo Conselho de Saúde, mas não precisa constar do Plano de Saúde.
B) participação complementar será formalizada mediante contrato ou convênio entre o poder público e a entidade privada, observado, apenas, o que dita a Portaria que rege a matéria.
C) entidade filantrópica ou a sem fins lucrativos deve priorizar o atendimento à sua clientela privada e, somente então, atender às demandas originárias do SUS.
D) gestor somente poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência à saúde, se utilizada toda a capacidade instalada dos serviços públicos de saúde e comprovada e justificada a necessidade de complementar a rede e, ainda, se houver impossibilidade de ampliação dos serviços públicos.
E) tabela de procedimentos da entidade conveniada será adotada para efeito de remuneração dos serviços contratados.

15. Com relação à investigação epidemiológica de casos e epidemias, é **CORRETO** afirmar que

- A) somente se justifica e deve ser iniciada após a notificação de casos isolados ou agregados de doenças/agravos, clinicamente declarados.
B) seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos.
C) envolve obrigatoriamente o exame do doente e opcionalmente o exame de seus contatos.
D) a primeira providência a ser tomada no sentido de minimizar as consequências do agravo para o indivíduo é se adotarem medidas de isolamento.
E) o propósito da fase “busca de pistas” numa investigação epidemiológica é o de identificar casos ainda não notificados ou aqueles oligossintomáticos que não buscaram atenção médica.

16. Com relação ao esquema básico de vacinação em crianças, é **CORRETO** afirmar que

- A) a dose inicial da tríplice viral (SRC) se dá entre os 4 e 6 anos.
B) a primeira dose da vacina oral de rotavírus humano é possível até os 4 meses. Findo este período, está contraindicada.
C) a primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido.
D) a vacina contra febre amarela está indicada apenas para crianças que residam em área endêmica.
E) entre a primeira e a segunda dose da vacina oral de rotavírus humano, deve-se guardar um intervalo de 8 semanas.

17. Com relação ao esquema básico de vacinação em adultos e idosos, é **CORRETO** afirmar que

- A) a partir dos 20 anos, gestantes, não gestantes, homens e idosos em cuja documentação se ateste esquema incompleto de dT (difteria e tétano) devem reiniciar o esquema vacinal proposto para o caso.
B) a vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.
C) mulher grávida que esteja com a vacina dT em dia, mas cuja última dose se deu há mais de 05 (cinco) anos, não precisa receber dose de reforço antes do parto.
D) a vacina contra Febre Amarela no adulto/idoso está indicada somente para aqueles que forem viajar para áreas endêmicas.
E) para os idosos que convivem em instituições fechadas, o reforço da vacina contra pneumococo deve acontecer a cada cinco anos a contar da dose inicial.

24. Acerca dos parâmetros de processamento de sinal no estudo Dopplerfluxométrico, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O ganho regula a amplificação do sinal recebido.
- B) O tamanho de amostra determina o intervalo receptivo do equipamento de ultrassom Doppler aos ecos.
- C) A filtragem elimina os ecos de alta velocidade, que podem representar ruídos provenientes da movimentação das partes moles adjacentes aos vasos analisados, assim como determina a frequência de pulsação do feixe de mapeamento Doppler.
- D) A rejeição elimina os ecos de baixa amplitude que correspondem a ruídos de fundo causados pelos circuitos de amplificação.
- E) Os histogramas possibilitam a avaliação da distribuição espectral de frequências para um dado instante do mapeamento pulsado.

25. Sobre o lobo caudado do fígado, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Corresponde ao segmento (I) de Couinaud e é vascularizado, apenas, pela artéria hepática, com drenagem venosa diretamente para a veia gástrica esquerda.
- B) Recebe vasos, apenas, do ramo direito da veia porta e corresponde ao segmento (I) de Couinaud, apresentando drenagem venosa diretamente para a veia mesentérica superior.
- C) Recebe vasos, apenas, do ramo esquerdo da veia porta e corresponde ao segmento (II) de Couinaud, apresentando drenagem venosa diretamente para a veia cava inferior.
- D) Corresponde ao segmento (I) de Couinaud e recebe vasos tanto dos ramos direito e esquerdo da veia porta como da artéria hepática, com drenagem venosa diretamente para a veia cava inferior.
- E) Recebe vasos, apenas, dos ramos direito e esquerdo da veia porta, com drenagem venosa diretamente para a veia mesentérica superior, correspondendo ao segmento (II) de Couinaud.

26. Na avaliação ultrassonográfica de tumores mesenquimais retroperitoneais, no intervalo etário compreendido entre 25 e 50 anos de idade, o médico ecografista deve ter o CORRETO conhecimento de que

- A) o lipossarcoma corresponde à neoplasia de natureza maligna mais frequente.
- B) o linfangioma corresponde à neoplasia de natureza benigna mais frequente.
- C) o paraganglioma corresponde à neoplasia de natureza benigna mais frequente.
- D) o Schwannoma corresponde à neoplasia de natureza benigna menos frequente.
- E) o leiomiossarcoma corresponde à neoplasia de natureza maligna mais frequente.

27. A fusão anormal dos tecidos mesenquimais, formando nódulos aberrantes de tecido esplênico, é denominada de

- A) baço acessório.
- B) banda esplênica.
- C) baço itinerante.
- D) poliesplenia.
- E) fusão esplenogonadal.

28. Dentre as patologias ginecológicas, o médico ecografista deve ter o correto conhecimento de que a síndrome de Stein-Leventhal caracteriza-se pela presença de

- A) ovários policísticos, obesidade, amenorreia ou oligomenorreia, comprometimento da fertilidade e hirsutismo.
- B) cistos renais, hepáticos e esplênicos, tumores ovarianos sólidos, peso abaixo do padrão normal, nódulos cutâneos e hirsutismo.
- C) cistos renais, tumores ovarianos sólidos, nódulos cutâneos, obesidade e hirsutismo.
- D) cistos hepáticos, cisto tecal-luteínico, nódulos cutâneos, peso abaixo do padrão normal e hirsutismo.
- E) cistos pancreáticos, cisto folicular, nódulos cutâneos, obesidade e hirsutismo.

29. Com relação à anatomia fetal, o médico ecografista deve ter o correto conhecimento de que as osteogêneses da clavícula e da mandíbula iniciam-se em torno da

- A) terceira semana de gestação.
- B) quinta semana de gestação.
- C) oitava semana de gestação.
- D) décima segunda semana de gestação.
- E) décima quinta semana de gestação.

30. O Sinal de Spalding corresponde ao(à)

- A) oligohidrânio.
- B) fragmentação da pele fetal.
- C) edema placentário.
- D) descolamento placentário.
- E) cavalgamento dos ossos do crânio.