

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CONCURSO PÚBLICO**

**DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

*Não deixe de preencher as informações a seguir:*

<i>Prédio</i>		<i>Sala</i>
<i>Nome</i>		
<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>
		<i>Nº de Inscrição</i>

**MÉDICO / OTORRINOLARINGOLOGIA**

***ATENÇÃO***

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos da Especialidade Médica de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

**01. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamentou a Lei 8080/90 e trouxe definições importantes para o planejamento das ações no SUS. Faça a correlação entre as colunas.**

- |   |  |
|---|--|
| <b>A. Rede de Atenção à Saúde</b>             | <input type="checkbox"/> Espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. |
| <b>B. Região de Saúde</b>                     | <input type="checkbox"/> Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.   |
| <b>C. Serviços Especiais de Acesso Aberto</b> | <input type="checkbox"/> Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.   |

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) B – A – C                      B) A – B – C                      C) A – C – B                      D) C – A – B                      E) C – B – A

**02. Podemos entender o SUS da seguinte maneira: um núcleo comum, que concentra os princípios doutrinários e um núcleo de operacionalização, os princípios organizativos. Os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde estão presentes na alternativa**

- A) Descentralização / Equidade  
B) Universalização / Integralidade  
C) Regionalização / Descentralização  
D) Universalização / Regionalização  
E) Integralidade / Regionalização

**Responda as questões de 03 a 06, de acordo com a legenda abaixo:**

- A) Apenas as afirmativas **a** e **c** estão corretas.  
B) Apenas as afirmativas **b** e **c** estão corretas.  
C) Apenas a afirmativa **b** está correta.  
D) Todas as afirmativas estão corretas.  
E) Todas as afirmativas estão incorretas.

**03. Em relação às características do Sistema Fragmentado de Assistência à Saúde, assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Voltado para os indivíduos  
b) Financiamento de procedimentos  
c) Gestão da oferta

**04. As Conferências Nacionais de Saúde são espaços destinados a analisar os avanços e retrocessos do SUS e a propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde.**

- a) A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) teve como tema central a saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento setorial.  
b) A 13ª Conferência Nacional de Saúde (2008) discutiu sobre as Políticas de Estado e Desenvolvimento.  
c) Na 10ª CNS, o principal assunto abordado foi a questão da construção de modelo de atenção à saúde. Nesse mesmo ano de 1996, foi criada a NOB 96 - Norma de Operação Básica do SUS. Na 10ª CNS, os mecanismos de participação já estavam consolidados.

**05. É função do Ministério da Saúde dispor de todas as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias, melhorando a vigilância à saúde e ofertando qualidade de vida ao brasileiro.**

- a) É por causa dessas atribuições que o Ministério da Saúde impõe o desafio de garantir o direito do cidadão ao atendimento à saúde e prover condições para que esse direito esteja ao alcance da população, independente da condição social de cada um.  
b) A Constituição Federal de 1988 deu um importante passo na garantia do direito à saúde com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), no entanto seus princípios não possibilitaram uma concreta democratização da saúde para os brasileiros.  
c) Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde que detalha o funcionamento do SUS. Foram mudanças profundas na Saúde Pública brasileira que exigiram, para sua implantação e funcionamento, o aprimoramento do sistema de informação em saúde.

**06. No início de 2009, foi colocado em prática o plano de Regionalização da Saúde em Pernambuco.**

- a) Estado e municípios se juntaram para democratizar o acesso à saúde da população, evitando a concentração de atendimento na Região Metropolitana do Recife (RMR) e oferecendo assistência de forma descentralizada, hierarquizada e regionalizada.
- b) O processo de regionalização envolveu, sistemicamente, apenas, a secretaria-executiva de Regulação, responsável pela implantação do projeto em Pernambuco.
- c) De forma análoga a outros estados com experiências positivas em Regionalização de Saúde, como Minas Gerais e São Paulo, o processo em Pernambuco tem como ferramenta principal os consórcios públicos.

**07. Em relação ao novo esquema de vacinação, marque V para as sentenças Verdadeiras e F para as Falsas.**

- ( ) Ao nascer, a criança deverá receber a vacina BCG-ID em dose única.
- ( ) A 1ª dose da vacina contra a Hepatite B não deve ser administrada ao nascer, mas, sim, aos 2 meses de vida.
- ( ) A vacina Tetravalente foi substituída pela Pentavalente.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V – V – V                      B) V – V – F                      C) V – F – V                      D) F – V – F                      E) F – F – F

**08. Os Conselhos de Saúde exercem o Controle Social do SUS. Nesse aspecto, analise as assertivas abaixo e marque V nas sentenças Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competência fixadas na Lei Nº 8.142/90.
- ( ) O Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário, que, além das comissões intersetoriais, estabelecidas na Lei Nº 8.080/90, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão dispor de integrantes não conselheiros.
- ( ) As resoluções do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 (trinta) dias, dando-se-lhes publicidade oficial.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V – V – V                      B) V – V – F                      C) V – F – V                      D) F – V – F                      E) F – F – F

**09. A taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população de 15 a 49 anos mantém-se estável em 0,6% desde 2004, sendo 0,4% entre as mulheres e 0,8% entre os homens. Em relação aos grupos populacionais com mais de 18 anos de idade em situação de maior vulnerabilidade, estudos realizados em dez municípios brasileiros, entre 2008 e 2009, estimaram maiores taxas de prevalência de HIV no seguinte grupo:**

- A) Usuários de drogas.
- B) Homens que fazem sexo com homens.
- C) Mulheres profissionais do sexo.
- D) Recém-nascidos.
- E) Mulheres na faixa etária de 15 a 24 anos.

**10. Em relação às doenças Emergentes e Reemergentes no Brasil, analise as assertivas abaixo e marque V nas sentenças Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) O aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, em geral, está relacionado à ocupação desordenada do espaço e à pobreza.
- ( ) A destruição da cobertura vegetal da Amazônia provoca desequilíbrios na fauna. Como consequência, pode ocorrer a multiplicação e disseminação de mosquitos e outros animais associados às matas capazes de transmitir para o homem microrganismos causadores de doenças.
- ( ) Os fluxos migratórios não podem ser considerados na disseminação de doenças reemergentes.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V – V – V                      B) V – V – F                      C) V – F – V                      D) F – V – F                      E) F – F – F

**11. São características do Conselho Nacional de Saúde:**

- A) caráter temporário e composto por portaria do Ministério da Saúde.
- B) caráter permanente e composto por funcionários públicos municipais e de funções consultivas.
- C) caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado e composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários.
- D) caráter temporário e composto por profissionais de saúde para definir os programas de saúde do país.
- E) caráter permanente composto por funcionários estaduais indicados pelos secretários de saúde dos estados.

**12. O médico poderá fornecer atestado médico com diagnóstico, mesmo pelo CID-10, para planos de saúde e seguradoras nas seguintes situações:**

- A) sempre, pois é obrigatório ao médico fornecer o diagnóstico da doença.
- B) para abonar falta ao trabalho em emprego público.
- C) para reembolso da consulta médica na seguradora.
- D) quando o paciente ou seu representante legal solicitar.
- E) para o sinistro da seguradora de saúde.

**13. Entre as medidas para prevenção primária visando à diminuição da incidência de infecção pelo HPV, destaca-se a**

- A) realização semestral de colposcopia e citologia de colo uterino.
- B) distribuição de pílulas anticoncepcionais mensalmente.
- C) cauterização sistemática de lesões do colo uterino.
- D) prescrição do uso de preservativo e distribuição pelos postos de saúde.
- E) seleção rigorosa dos parceiros sexuais.

**14. Várias estratégias podem ser adotadas pelas equipes de saúde para favorecer os princípios propostos pela política nacional de humanização. São exemplos de ações estratégicas, EXCETO:**

- A) fortalecer o trabalho em equipe multidisciplinar, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
- B) sensibilizar as equipes de saúde quanto ao problema de violência intrafamiliar (criança, mulher e idoso).
- C) acolher os usuários, baseando-se na ordem de chegada ao serviço de saúde e na organização de filas para que se promova otimização do atendimento.
- D) definir os protocolos clínicos, garantindo-se a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando-se a individualidade do sujeito.
- E) garantir a referência e contrarreferência, resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e transferência segura, conforme necessidade do usuário.

**15. Todas as alternativas abaixo contêm antibióticos que interferem na síntese da parede celular bacteriana, EXCETO**

- A) penicilina.                      B) clindamicina.                      C) cefalosporina.                      D) carbapenêmicos.                      E) vancomicina.

**16. Todas as alternativas abaixo fazem parte das ações específicas da Política Nacional de Promoção de Saúde publicada pelo governo federal em 2006, EXCETO:**

- A) Investir na sensibilização e capacitação dos gestores e profissionais de saúde na identificação e no encaminhamento adequado de situações de violência intrafamiliar e sexual.
- B) Promover ações visando ao tratamento hospitalar da dengue em áreas urbanas.
- C) Apoiar as campanhas de divulgação em massa dos dados referentes às mortes e sequelas provocadas por acidentes de trânsito.
- D) Sistematizar ações educativas e mobilizar ações legislativas e econômicas, de forma a criar um contexto que reduza a aceitação social do tabagismo e aumente o acesso dos fumantes ao apoio para a cessação de fumar.
- E) Ofertar práticas corporais/atividade física, como caminhadas, prescrição de exercícios, práticas lúdicas, esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, voltadas tanto para a comunidade como um todo quanto para grupos vulneráveis.

**17. Os casos de suspeita ou confirmação de violência contra o idoso, de acordo com o estatuto do idoso, preveem a notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária bem como fica obrigado a comunicar à(ao)**

- A) Secretaria estadual de segurança.
- B) Secretaria municipal de assistência social.
- C) Conselho municipal dos direitos humanos.
- D) Secretaria estadual de planejamento.
- E) Conselho municipal do idoso.



**26. Sobre as Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA), pode-se afirmar que**

- A) as EOA evocadas transientes são sons de alta intensidade produzidos pela cóclea.
- B) as EOA evocadas transientes são sons de média intensidade produzidos pela cóclea.
- C) as EOA fornecem informações sobre a funcionalidade das células ciliadas internas.
- D) em relação à triagem auditiva neonatal com EOA, deve-se realizar o procedimento logo após o nascimento.
- E) as EOA são produzidas exclusivamente pelas células ciliadas externas do órgão de Corti..

**27. Sobre paralisia laríngea, pode-se afirmar que**

- A) na síndrome de Gerhardt, existe a paralisia dos músculos constrictores da glote.
- B) pode ocorrer devido à estenose mitral que provoca dilatação da aurícula esquerda e subsequente compressão do nervo contra o brônquio.
- C) na paralisia bilateral do nervo laríngeo superior, as pregas vocais apresentam-se imóveis e em abdução.
- D) na paralisia laríngea pós-tireoidectomia total, é permanente.
- E) na paralisia laríngea unilateral em abdução, o paciente apresenta-se com rouquidão e dispneia.

**28. Em relação às alterações estruturais mínimas, pode-se afirmar que**

- A) a assimetria laríngea é incompatível com a voz normal.
- B) a vasculodisgenesia é um arranjo vascular longitudinal à borda da prega vocal normal.
- C) a membrana laríngea pode dificultar ou impedir a muda vocal.
- D) o sulco vocal é geralmente unilateral.
- E) os desvios na proporção glótica não geram alterações na voz.

**29. Quanto às características do nistagmo de posicionamento de origem central, é CORRETO afirmar que**

- A) apresenta tontura concomitante.
- B) é de curta duração, geralmente menor que 30 segundos.
- C) é puro vertical ou puro torsional.
- D) é fatigável com a repetição da manobra.
- E) está relacionado ao plano do canal estimulado.

**30. Em relação à tontura, pode-se afirmar que**

- A) as causas centrais mais frequentes são insuficiência vertebrobasilar, migrânea, esclerose múltipla e tumores da fossa posterior.
- B) as crises de origem central raramente estão associadas ao desequilíbrio.
- C) as crises de origem central geralmente estão associadas à náusea.
- D) as crises de tonturas de origem central costumam ser mais exacerbadas que nas de origem periférica.
- E) as crises de origem central raramente apresentam nistagmo.

**31. Qual das alternativas abaixo NÃO correspondem à causa de zumbido pulsátil?**

- A) Carótida interna aberrante
- B) Hipertensão craniana
- C) Síndrome de pseudotumor cerebral
- D) Fístula arteriovenosa dural
- E) Hemangioma occipital

**32. Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Das células ciliadas internas da cóclea, partem 3 vezes mais fibras aferentes que das externas.
- B) As células ciliadas internas apresentam vibração ativa.
- C) As células ciliadas externas não recebem fibras eferentes.
- D) As células ciliadas internas não recebem fibras eferentes.
- E) Nenhuma das respostas acima está correta.

**33. Um paciente de 34 anos tem queixa de ouvido tampado à direita. A otoscopia mostra desse lado uma membrana timpânica íntegra, por meio da qual, por transparência, percebe-se a orelha média ocupada por uma massa vermelha. Entre as alternativas abaixo, qual reúne medidas propedêuticas indicadas para o caso?**

- A) Audiometria, eletromiografia facial, tomografia computadorizada.
- B) Biópsia, angiografia digital, angiorressonância.
- C) Audiometria, tomografia computadorizada, angiografia digital.
- D) Pesquisa de autoanticorpos, tomografia computadorizada, audiometria.
- E) Angiografia digital, impedanciometria, biópsia.

**34. Com relação à propedêutica naso-sinusal, é CORRETO afirmar que**

- A) a radiografia simples dos seios paranasais é um exame de baixo custo, alta especificidade e alta sensibilidade para a sinusite aguda.
- B) a tomografia de seios da face sem contraste é o melhor exame para avaliação de alterações anatômicas e inflamatórias dos seios da face.
- C) a ressonância nuclear magnética é o melhor exame para avaliar a anatomia do labirinto etmoidal.
- D) a endoscopia nasal é o exame mais sensível para avaliar a anatomia do recesso fronto-etmoidal.
- E) a história clínica tem pouca importância para o diagnóstico da sinusite.

**35. Com relação à sinusite fúngica, é INCORRETO afirmar que**

- A) os agentes etiológicos mais comuns são do gênero *Aspergillus*.
- B) o diagnóstico é confirmado pelo exame direto e pela cultura.
- C) é mais comum em pacientes imunodeprimidos.
- D) a tomografia computadorizada não mostra alterações específicas.
- E) o tratamento é quase sempre cirúrgico.

**36. NÃO são causas de granulomatose nasal:**

- A) Trauma nasal e corpo estranho nasal.
- B) Rinoscleroma e reticulose polimórfica.
- C) Hanseníase e zigomicose.
- D) Mucoviscidose e papiloma invertido.
- E) Sarcoidose e histiocitose.

**37. NÃO é considerada alteração estrutural mínima das pregas vocais:**

- A) Sulco vocal.
- B) Cisto epidermoide.
- C) Microdiafragma laríngeo.
- D) Ponte de mucosa.
- E) Edema de Reinke.

**38. Assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A tireoplastia tipo I é usada para a paralisia unilateral em adução.
- B) A tireoplastia tipo III é usada para reduzir a frequência fundamental.
- C) A tireoplastia tipo I é realizada sob anestesia local.
- D) A rotação de aritenóide é usada para a paralisia unilateral em abdução.
- E) A tireoplastia tipo IV é usada para elevar a frequência fundamental.

**39. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da estrutura histológica da tonsila palatina.**

- A) O folículo linfóide contém, apenas, linfócitos B.
- B) A zona interfolicular contém linfócitos T e macrófagos.
- C) Os linfócitos B ativados situam-se na periferia do folículo linfóide.
- D) As células M situam-se no centro germinativo do folículo.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

**40. Qual é o melhor exame para avaliar o diâmetro ântero-posterior da tonsila faríngea numa criança de 7 anos?**

- A) Fibronasofaringoscopia
- B) Endoscopia nasal rígida
- C) Radiografia do cavum em perfil.
- D) Rinoscopia posterior
- E) Radiografia dos seios da face

**41. São causas de paralisia de prega vocal em crianças, EXCETO**

- A) infecções congênitas (por exemplo, sífilis).
- B) trauma de parto.
- C) má formação de Arnold-Chiari.
- D) trauma cirúrgico (p. ex. cirurgias cardíacas ou correção de fístula tráqueo-esofágica).
- E) cisto na epiglote.

**42. Assinale a alternativa que contém as alterações mínimas das pregas vocais.**

- A) Sulco vocal, cisto epidermoide, microdia fragma e edema de Reinke.
- B) Sulco vocal, cisto epidermoide, ponte mucosa e pólo vocal.
- C) Sulco vocal, cisto epidermoide, microdia fragma e vasculodisgenesia.

- D) Sulco vocal, cisto epidermoide, vasculodisgenesia e nódulo.
- E) Sulco vocal, cisto epidermoide, pólipo e nódulo.

**43. Assinale a alternativa CORRETA em relação à angina de Ludwig.**

- A) Infecção de origem dentária que acomete o espaço sublingual e os espaços submaxilares bilaterais, caracterizada por edema dos tecidos moles supra-hioides.
- B) É a formação da coleção purulenta entre a cápsula tonsilar e as fâscias dos músculos constritores da faringe, em geral na região anterossuperior.
- C) Doença infecciosa causada pela associação entre um bacilo fusiforme (gram-negativo, anaeróbio) e um espirilo (saprófitas da cavidade oral).
- D) É uma infecção do espaço retrofaríngeo, causada por processos supurativos das adenoides.
- E) Complicação das tonsilites faríngeas pelo Epstein-Barr em adultos diabéticos.

**44. Nos traumatismos do osso temporal com surdez sensorioneural, é mais provável que tenha ocorrido**

- A) hemotímpano.
- B) fratura longitudinal do osso temporal.
- C) fratura transversa do osso temporal.
- D) fratura da cadeia ossicular.
- E) laceração da membrana timpânica.

**45. Qual o músculo abductor da laringe?**

- A) Crico-aritenoideo posterior.
- B) Crico-aritenoideo lateral.
- C) Aritenoideo transverso.
- D) Tirocricoideo.
- E) ariaritenoideo oblíquo.

**46. O aumento da viscosidade do exsudato intratimpânico na otite média secretora é devido ao aumento de**

- A) virulência do germe.
- B) hiperplasia da mucosa.
- C) pressão intratimpânica.
- D) glicoproteína.
- E) hipoventilação.

**47. São fatores de risco para rinosinusite bacteriana, EXCETO**

- A) rinite alérgica.
- B) desvio de septo.
- C) otite média aguda.
- D) refluxo gastroesofágico.
- E) esporão de septo nasal.

**48. O Schwannoma do VIII nervo se origina mais comumente no**

- A) nervo facial.
- B) ramo vestibular superior.
- C) ramo vestibular inferior.
- D) ramo coclear.
- E) nervo trigêmeo.

**49. Na audiometria, o fenômeno de recrutamento é característico de lesão**

- A) coclear.
- B) do glânglio de Corti.
- C) retrococlear.
- D) da via auditiva central.
- E) do glânglio de Scarpa.

**50. O espaço parafaríngeo pode ser acometido secundariamente por infecções do seguinte espaço (levando em consideração suas relações anatômicas)**

- A) parotídeo.
- B) mastigatório.
- C) retrofaríngeo.
- D) submandibular.
- E) todos.