

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS

01. A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 29, de 2000 trata prioritariamente

- A) do Controle Social.
- B) das ações e serviços de saúde na alta complexidade.
- C) da Atenção Básica de Saúde.
- D) dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.
- E) das competências do Conselho Nacional de Saúde.

02. A lei complementar que regulamentou o § 3º do artigo 198 da Constituição Federal estabeleceu valores e percentuais mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Para Estados e Municípios, os valores referentes à arrecadação de impostos, são, no mínimo, respectivamente

- A) 12% e 15%.
- B) 10% e 12%.
- C) 12% e 12%.
- D) 15% e 10%.
- E) 15% e 15%.

03. No Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Esse direito está garantido mediante uma (um)

- A) emenda constitucional.
- B) lei complementar.
- C) resolução do Conselho Nacional de Saúde.
- D) artigo da Constituição Federal.
- E) decreto presidencial.

04. A organização, a direção e a gestão do Sistema Único de Saúde estão regulamentadas pela legislação brasileira. Sobre a direção do SUS em nível municipal, leia as sentenças abaixo:

- I. A direção é única e cabe à Secretaria Municipal ou órgão equivalente.
- II. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- III. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde - SUS poderá organizar-se em distritos.
- IV. A participação da iniciativa privada está excluída da direção municipal.
- V. No nível municipal, a direção do SUS é compartilhada pelo nível estadual.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

05. Sobre a competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS, leia as sentenças a seguir:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">I. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde – SUS em articulação com sua direção estadual.II. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.III. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.IV. Executar serviços de alimentação e nutrição.V. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto com os órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las. |
|---|

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

06. Sobre a participação da comunidade do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas abaixo:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">I. Na esfera Municipal, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, existem as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde e a Câmara Municipal de Saúde.II. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.III. A representação dos usuários no Conselho Municipal de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.IV. A Conferência Municipal de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos.V. A representação dos usuários na Conferência Municipal é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. |
|---|

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

07. A política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem sido aprovada mediante portarias ministeriais. Recentemente foi aprovada a nova PNAB, mediante a Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017. Nessa portaria, define-se que a Atenção Básica requer um conjunto de atividades de saúde individuais, familiares e coletivas, que podem envolver as seguintes ações:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">I. Promoção à saúdeII. Prevenção de doençasIII. Diagnóstico e tratamentoIV. ReabilitaçãoV. Cuidados Paliativos |
|--|

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

08. Diferentemente das portarias anteriores que aprovaram a PNAB, a Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017 estabelece:

- | |
|---|
| I. A recomendação da inclusão do Gerente de Atenção Básica |
| II. A população adscrita por Equipe de Atenção Básica (eAB) |
| III. O número máximo de 750 pessoas por Agente Comunitário de Saúde |
| IV. O profissional de saúde bucal na Equipe de Saúde da Família |
| V. A definição de um território |

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

09. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008, com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, configurando-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com

- | |
|---|
| I. As equipes de Saúde da Família (eSF). |
| II. As equipes de atenção básica para consultórios na rua. |
| III. As equipes de atenção básica para equipes ribeirinhas. |
| IV. As equipes de atenção básica para equipes fluviais. |
| V. O Programa Academia da Saúde. |

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

10. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Esse direito está garantido na

- A) Constituição Federal de 1988.
- B) Resolução do Conselho Nacional de Saúde.
- C) Organização Mundial de Saúde.
- D) Declaração Universal de Direitos Humanos.
- E) Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90).

11. A rede de atenção à saúde, compreendida pelo Decreto 7.508 de 2011, visa majoritariamente atender ao seguinte princípio do Sistema Único de Saúde:

- A) Universalidade.
- B) Integralidade.
- C) Igualdade.
- D) Regionalização.
- E) Descentralização.

12. A Atenção Básica é um dos componentes estruturais da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Sobre as competências da Atenção Básica nessa Rede, leia as sentenças abaixo:

- I. Realizar o diagnóstico, o rastreamento e o tratamento da sua população adstrita de acordo com os protocolos e as diretrizes clínicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou elaboradas pelo nível local.
- II. Prevenir, diagnosticar e tratar precocemente as possíveis complicações decorrentes das doenças crônicas.
- III. Coordenar o cuidado das pessoas com doenças crônicas, mesmo quando referenciadas para outros pontos da Rede de Atenção à Saúde.
- IV. Acionar a Academia da Saúde e/ou outros equipamentos disponíveis no território como forma de contribuir para o cuidado das pessoas com doenças crônicas, de acordo com as necessidades identificadas.
- V. Realizar ações de promoção da saúde e de prevenção das doenças crônicas de forma intersectorial e com participação popular, considerando os fatores de risco mais prevalentes na população.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

13. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS consideram, entre outros critérios, o tamanho da população dos municípios. Considerando esse critério populacional, qual modalidade de CAPS seria indicada para o município de Pombos?

- A) CAPS I B) CAPS II C) CAPS III D) CAPS IV E) CAPS AD

14. Sobre os componentes que constituem a Rede de Atenção Psicossocial, analise os itens a seguir:

- I. Unidade Básica de Saúde
- II. Equipe de Consultório na Rua
- III. SAMU 192
- IV. UPA 24 horas
- V. Centros de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todos estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro corretos.
- C) Existem, apenas, três corretos.
- D) Existem, apenas, dois corretos.
- E) Existe, apenas, um correto.

15. Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde, leia as sentenças abaixo:

- I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- IV. Participação da comunidade.
- V. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Qual das alternativas abaixo corresponde ao fenômeno pelo qual o paciente percebe uma alucinação como estranha à sua pessoa ?

- A) Estranheza do mundo percebido
- B) Alucinação funcional
- C) Alucinose
- D) Pseudoalucinação
- E) Alucinação negativa

17. Qual das alternativas abaixo corresponde ao impulso patológico de destruir objetos que circundam o indivíduo?

- A) Cataplexia
- B) Dipsomania
- C) Catalepsia
- D) Poriomania
- E) Frangofilia

18. A entrevista psiquiátrica é uma ferramenta importante para o diagnóstico e tratamento do transtorno mental. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA quanto à entrevista psiquiátrica.

- A) Nas fases iniciais da entrevista, o paciente ansioso pode utilizar manobras e mecanismos de defesa, como risos ou perguntas inadequadas, e, nesse momento, o entrevistador deve ficar em silêncio, no intuito de não reforçar tal situação e tentar entender melhor o paciente.
- B) O entrevistador deve evitar certas posturas e atitudes, como posturas rígidas e estereotipadas, atitude excessivamente fria ou neutra, reações exageradamente emotivas ou artificialmente calorosas, comentários valorativos ou julgamentos, reações emocionais de pena ou compaixão e fazer muitas anotações durante a entrevista.
- C) O entrevistador deve buscar para cada paciente, em particular, o tipo de intervenção que facilite a continuidade de sua fala.
- D) A aparência do paciente na entrevista também é um recurso importante para o diagnóstico, e, quando o paciente comparece com roupas chamativas, curtas e decotadas, com muita maquiagem e perfume, pode ser indício de que seja um caso de mania ou de histeria.
- E) A atitude desinibida do paciente pode ser percebida quando ele trata o entrevistador como se o conhecesse há anos.

19. Amplo conjunto de habilidades que permite manter e manipular informações novas, acessando as antigas, que são mantidas ativas, em geral por curto período. Tal conceito refere-se à

- A) Memória de evocação.
- B) Memória de trabalho.
- C) Memória episódica.
- D) Memória de procedimentos.
- E) Memória semântica.

20. O *delirium* é um transtorno neuropsiquiátrico, caracterizado pela perturbação da atenção e da consciência, que se desenvolve normalmente de horas a poucos dias e que tende a oscilar quanto à gravidade ao longo de um dia. Sobre esse transtorno, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São considerados fatores predisponentes: idade elevada, prejuízo cognitivo pré-existente e episódio prévio de *delirium*.
- B) O subtipo hipoativo é o mais comum entre os idosos.
- C) O (EEG) eletroencefalograma pode mostrar lentificação generalizada.
- D) Sua fisiopatologia resulta de uma interação de fatores, que afetam a neurotransmissão, particularmente a da dopamina, a da acetilcolina e a da adenosina.
- E) São medicações que podem ser utilizadas para o seu tratamento: o haloperidol, a risperidona, a quetiapina, a olanzapina e o lorazepam.

21. O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de obsessões e/ou compulsões, que causam sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Sobre esse transtorno, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Frequentemente os pacientes com TOC apresentam fenômenos sensoriais, que são experiências subjetivas auditivas, visuais, táteis ou musculoesqueléticas desconfortáveis e angustiantes, que podem anteceder, acompanhar ou resultar de uma compulsão.
- B) O TOC se associa a outros transtornos mentais em até 90% dos casos em tratamento psiquiátrico, sendo o transtorno depressivo recorrente o mais frequente.
- C) As compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais nos quais a pessoa se sente compelida a executar em resposta a uma obsessão e que visam prevenir ou reduzir o sofrimento ou evitar algum evento ou situação temida.
- D) Sertralina, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina e venlafaxina são considerados medicamentos de primeira linha para o tratamento do TOC.
- E) Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) associada com Inibidor Seletivo de Receptação de Sirotonina (ISRS) é mais eficaz que o ISRS isoladamente.

22. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um achado clínico que pode ser identificado na Demência por Corpos de Lewy.

- A) Flutuações cognitivas
- B) Alterações do sono REM
- C) Incontinência urinária
- D) Alucinações visuais
- E) Parkinsonismo espontâneo

23. A depressão é o transtorno psiquiátrico mais frequente, de curso crônico e recorrente. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao tratamento desse transtorno.

- A) O uso da cetamina em doses altas tem sido uma opção promissora para o tratamento da depressão refratária.
- B) O uso dos Inibidores da Monoaminoxidase (IMAOs) deve ser acompanhado de dieta rigorosa devido ao risco de crise hipertensiva grave.
- C) A vortioxetina é o único antidepressivo multimodal liberado atualmente no Brasil, tendo como vantagem a melhora na função cognitiva.
- D) A Eletroconvulsoterapia (ECT) é uma opção segura para o tratamento de gestantes com depressão.
- E) A quetiapina em monoterapia é uma opção terapêutica com boa eficácia.

24. Assinale a alternativa que corresponde ao psicofármaco, que, em doses baixas, bloqueia os receptores 5HT_{2a}, H₁ e α 1, tendo efeito hipnótico e, em doses altas, age como antagonista dos receptores 5HT_{2a}, 5HT_{2c} e α 2 e como inibidor da recaptção de serotonina.

- A) Vortioxetina
- B) Trazodona
- C) Agomelatina
- D) Mirtazapina
- E) Quetiapina

25. Segundo o DSM-5, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) tem como característica essencial o desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou mais eventos traumáticos. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o TEPT.

- A) Reações dissociativas podem ocorrer e ter duração variável desde poucos segundos até várias horas ou dias.
- B) Alterações marcantes na excitação e na reatividade, associadas ao evento traumático, tais como hipervigilância, resposta de sobressalto exagerado e/ou perturbação do sono, podem estar presentes.
- C) O risco do surgimento do TEPT e a sua gravidade dependem do tipo de exposição traumática, do impacto do significado atribuído ao evento traumático, do contexto sociocultural e de outros fatores culturais.
- D) Pode haver expressão tardia, quando os critérios diagnósticos não forem atendidos até pelo menos 6 meses depois do evento.
- E) Flashbacks, pesadelos e alucinações visuais ocorrem com frequência e aumentam o risco de suicídio nesses pacientes.

26. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Esquizofrenia.

- A) Complicações na gestação e no nascimento, com hipóxia e idade avançada dos pais, estão associadas a maior risco de esquizofrenia para o feto.
- B) Transtornos de personalidade Esquizotípica ou Paranoide podem, algumas vezes, anteceder o início da esquizofrenia.
- C) Em torno de 20% dos indivíduos com esquizofrenia tentam suicídio, e entre 5 a 6% morrem por suicídio.
- D) Casos de início tardio, após os 40 anos, são mais comuns em mulheres e cursam com predominância de sintomas negativos.
- E) Ganho de peso, diabetes mellitus, síndrome metabólica e doenças cardiovascular e pulmonar são mais comuns na esquizofrenia que na população em geral.

27. Assinale a alternativa que não seria boa opção para o tratamento da depressão no Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) do tipo I.

- A) Aripiprazol
- B) Quetiapina
- C) Lítio + ISRS
- D) Olanzapina + Fluoxetina
- E) Lamotrigina

28. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Transtorno Afetivo Bipolar.

- A) Cerca de 60% dos episódios maníacos ocorrem imediatamente antes de um episódio depressivo.
- B) As taxas de prevalência de suicídios tentados ao longo da vida parecem ser semelhantes nos dois tipos de TAB, porém a letalidade das tentativas pode ser maior nos do Tipo II.
- C) Transtornos mentais comórbidos são comuns no Tipo I, sendo os mais frequentes os transtornos ansiosos que ocorrem em cerca de três quartos dos indivíduos.
- D) A idade média de início do TAB do tipo II é um pouco mais tarde em comparação ao do tipo I e mais cedo em comparação com o Transtorno Depressivo Maior.
- E) Indivíduos do sexo masculino são mais suscetíveis a estados de ciclagem rápida e episódios mistos.

29. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

- A) Os transtornos disruptivos são as comorbidades mais frequentes nas crianças.
- B) É mais frequente no sexo feminino, e há um predomínio dos sintomas de desatenção, quando comparado aos do sexo masculino.
- C) Atrasos leves no desenvolvimento linguístico, motor e/ou social não são específicos do TDAH, embora costumem ser comórbidos.
- D) Está frequentemente associado a desempenho escolar e sucesso acadêmico reduzidos nas crianças e a piores desempenhos, sucesso e assiduidade no campo profissional nos adultos, além de maior probabilidade de desemprego e altos níveis de conflito interpessoal.
- E) São comportamentos frequentes: ter dificuldade para esperar a sua vez, perder objetos, chegar atrasado ou perder compromissos e cometer erros por descuido em tarefas escolares ou no trabalho.

30. Maria procurou o clínico no posto de saúde mais próximo de sua casa, relatando que seu esposo, o José, de 59 anos de idade vem tendo comportamento diferente do seu normal. Sempre foi uma pessoa calma, responsável, discreta e respeitosa. Descreve que, há aproximadamente 1 ano, José tem ficado muito hiperativo, dormindo pouco, muito irritado e se comportando de forma inadequada. Certa vez, ficou se insinuando para a sua vizinha, tendo falado palavras obscenas com alguma frequência. Ao ser questionada sobre esquecimentos, Maria diz que ele tem uma memória muito boa, melhor que a dela.

Sobre o caso clínico exposto, assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico mais provável.

- A) Demência de Alzheimer
- B) Demência por Corpos de Lewy
- C) Demência Frontotemporal
- D) Doença de Biswanger
- E) Hidrocefalia de pressão normal

31. Qual dos medicamentos abaixo NÃO é considerado uma boa opção para o tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)?

- A) Pregabalina
- B) Escitalopram
- C) Gabapentina
- D) Paroxetina
- E) Venlafaxina

32. Assinale a alternativa CORRETA sobre o Transtorno da Conduta (TC).

- A) O curso do transtorno é variável, mas, na maioria das pessoas, não há remissão na idade adulta, evoluindo para Transtornos de Personalidade.
- B) O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno de Oposição Desafiante (TOD) são comuns em indivíduos com TC, sendo essa apresentação comórbida preditora de bom prognóstico.
- C) No subtipo com início na adolescência, os indivíduos não apresentam nenhum sintoma característico do TC antes dos 12 anos de idade.
- D) Os pacientes com TC iniciado na infância são, na sua maioria, do sexo masculino, costumam apresentar agressão física contra outras pessoas e ter relacionamentos conturbados.
- E) Os pacientes do subtipo com início na adolescência também são, na sua maioria, do sexo masculino, mas diferem do subtipo com início na infância, por não apresentarem agressão física e terem relacionamentos mais habituais.

33. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o atual Modelo Assistencial em Saúde Mental no Brasil.

- A) São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção de urgência e emergência o SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de Saúde, entre outros.
- B) Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) deverão acolher pessoas com internação de longa permanência, egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia.
- C) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vinculado à Unidade Básica de Saúde, é constituído por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento, que atuam de maneira integrada, sendo responsável por apoiar as Equipes de Saúde da Família, as Equipes de Atenção Básica para populações específicas e equipes da academia da saúde, atuando diretamente no apoio matricial.
- D) O hospital psiquiátrico pode ser acionado para o cuidado das pessoas com transtorno mental nas regiões de saúde, enquanto o processo de implantação e expansão da Rede de Atenção Psicossocial ainda não se apresenta suficiente, devendo essas regiões de saúde priorizar a expansão e qualificação dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para dar continuidade ao processo de substituição dos leitos em hospitais psiquiátricos.
- E) O número de leitos de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas não deverá exceder o percentual de 10% (dez por cento) do número total de leitos do Hospital Geral.

34. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

- A) Os CAPS poderão localizar-se dentro dos limites da área física de uma unidade hospitalar geral, ou dentro do conjunto arquitetônico de instituições universitárias de saúde, desde que independentes de sua estrutura física, com acesso privativo e equipe profissional própria.
- B) O horário de funcionamento do CAPS I é no período das 8 às 18 h, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, mas podendo comportar excepcionalmente um terceiro turno até às 21 h.
- C) A assistência prestada aos pacientes no CAPS II inclui atividades, como atendimento individual, atendimento em grupos, atendimentos em oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e atendimento à família.
- D) É uma das atribuições do CAPS III constituir-se em serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas, diariamente, incluindo feriados e finais de semana.
- E) São algumas das características de funcionamento do CAPS AD III: orientar-se pelos princípios da Redução de Danos e ter disponibilidade para acolher casos novos e já vinculados, sem agendamento prévio e sem qualquer outra barreira de acesso, em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, das 7 às 19 h.

35. Paciente de 25 anos de idade procura emergência geral com quadro de agitação psicomotora, euforia, irritabilidade, aumento da temperatura corporal, taquicardia e pico hipertensivo (170 x 110 mmHg). Relata que começou a se sentir mal repentinamente, há aproximadamente 30 minutos, quando estava numa boate com os amigos. Nega uso de substâncias psicoativas durante a noite, exceto 2 doses de vodka que havia consumido na festa. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao diagnóstico desse paciente.

- A) Intoxicação por cocaína
- B) Intoxicação por maconha
- C) Embriaguez patológica
- D) Síndrome de Wernicke-Korsakoff
- E) Intoxicação por cetamina

36. Qual dos medicamentos abaixo NÃO tem indicação para tratamento de dependência de álcool ?

- A) Clonidina
- B) Dissulfiram
- C) Naltrexona
- D) Acamprosato
- E) Baclofeno

37. A Clozapina foi o primeiro antipsicótico atípico a ser desenvolvido e tem sua principal indicação nos casos de esquizofrenia refratária. Assinale a alternativa INCORRETA sobre esse psicofármaco.

- A) A principal isoenzima envolvida no seu metabolismo é a CYP450 1A2.
- B) São efeitos adversos possíveis: convulsões, constipação, sonolência, neutropenia e aumento de peso.
- C) A agranulocitose é o efeito adverso mais grave, não é dose-dependente e, na maioria dos casos, ocorre nos seis primeiros meses de tratamento, com pico de incidência no terceiro mês.
- D) Se a contagem total de neutrófilos for abaixo de $1.500/\mu\text{L}$, após as 18 primeiras semanas de tratamento com clozapina, recomenda-se suspendê-la.
- E) Estima-se que 10% dos pacientes em uso de clozapina desenvolvem sintomas obsessivo-compulsivos.

38. Os Transtornos Dissociativos são caracterizados por perturbação e/ou descontinuidade da integração normal de diversas funções psíquicas. Assinale a alternativa que corresponde ao transtorno dissociativo caracterizado por respostas aproximativas, em geral acompanhadas por vários outros sintomas dissociativos.

- A) Síndrome de Otelo
- B) Síndrome de Ekbon
- C) Síndrome de Ganser
- D) Síndrome de Capgras
- E) Síndrome de Rett

39. O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é o transtorno ansioso mais comum e o terceiro transtorno psiquiátrico mais frequente. Sobre ele, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Pacientes com TAS apresentam altas taxas de comorbidades psiquiátricas, sendo a Depressão, o Transtorno de Ansiedade Generalizada e o Transtorno de Pânico os mais comuns.
- B) Geralmente se inicia na adolescência e persiste na idade adulta, mas, em alguns casos, pode se iniciar na infância, o que pode levar a um intenso comprometimento psicossocial.
- C) A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é a psicoterapia, que apresenta melhor eficácia.
- D) Os IMAOs são também opções com eficácia comprovada para o tratamento farmacológico do TAS.
- E) O escitalopram, a paroxetina, a fluoxetina e a venlafaxina são os medicamentos de primeira linha.

40. Para qual das opções abaixo NÃO haveria indicação de tratamento com Eletroconvulsoterapia (ECT) ?

- A) Depressão com alto risco de suicídio
- B) Depressão melancólica
- C) Esquizofrenia do subtipo catatônico
- D) Depressão psicótica
- E) Estupor catatônico na depressão

EXECUÇÃO

