

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Enfermagem Offshore

(01) Enfermagem Offshore é a tradução do termo inglês: *Offshore Nursing*. Define, assim, o grupo de profissionais de Enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros que trabalham na área offshore. É a prestação da assistência de enfermagem desenvolvida na área de exploração e produção de petróleo e gás natural em alto-mar. Logo, as atividades dela são voltadas para os trabalhadores a bordo de plataformas, navios e unidades petrolíferas.

(02) Muitos dos profissionais de Enfermagem Offshore são oriundos de outras áreas da enfermagem, tais como: Emergência, Unidade de Terapia Intensiva e Enfermagem do Trabalho. Isso ocorre devido ao tipo de atividade desenvolvida por esses profissionais, que requer conhecimentos e habilidades específicas para prestar assistência no caso de lesões graves, decorrentes de operações complexas.

(03) A atividade tornou-se tão importante para a área que o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) reconheceu a Enfermagem Offshore como uma nova Especialidade da Enfermagem.

(04) Atualmente, devido às grandes descobertas de petróleo e gás no Brasil, realizadas pela Petrobras, aliadas à exploração de novas reservas ainda maiores, os investimentos no setor offshore tiveram um grande crescimento, com perspectivas maiores ainda nos próximos anos.

(05) O número de profissionais de enfermagem envolvidos neste setor vem crescendo de forma rápida desde então, acompanhando uma grande demanda e atraindo diversos enfermeiros que nunca trabalharam embarcados. Porém, será que estes que pleiteiam essas novas vagas sabem realmente quais serão os desafios a serem alcançados e os obstáculos a serem enfrentados em uma plataforma em alto-mar?

(06) Os profissionais de Enfermagem Offshore atualmente trabalham em turnos de 12 horas, em dois tipos de escalas e/ou regime de revezamento de embarque: escala 14X14: o enfermeiro permanece um período de 14 dias embarcado e outro período de 14 dias de folga; escala 14X21: o enfermeiro permanece um período de 14 dias embarcado e outro período de 21 dias de folga. Essa escala é aplicável apenas a funcionários concursados Petrobras devido a um acordo sindical.

(07) As empresas realizam suas contratações baseadas na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, posicionando os seus profissionais em níveis de carreira que variam do nível I ao IV. Outras selecionam por contrato de trabalho temporário (...). Existem empresas que terceirizam esse serviço através de outras empresas especializadas.

(08) Por se tratar de uma atividade em regime de confinamento, que apresenta situações peculiares, a relação enfermeiro-tripulação é de extrema importância e o profissional de enfermagem deve possuir um perfil bastante sociabilizável, pois sua interação com os demais tripulantes é um fator essencial para gerar relações de confiança e respeito, visto que ele será, em muitos casos, o único profissional de saúde a bordo.

(09) Existe, ainda, por parte de muitas empresas, o requisito para se contratarem profissionais que falem outra língua, de preferência, o inglês. Isso ocorre pelo fato de a maioria das empresas serem estrangeiras, com profissionais de diversas nacionalidades envolvidos nas operações a bordo.

(10) A possibilidade de um atendimento de emergência de grande proporção ou gravidade é uma realidade bastante provável para o Enfermeiro Offshore, uma vez que as operações envolvidas na exploração de petróleo e gás têm grande periculosidade, tanto que são classificadas pelo Ministério do Trabalho como de Grau de Risco IV, numa escala que vai de I a IV. Ou seja, é um dos serviços de maior risco no Brasil.

(11) Por ter essa característica, o enfermeiro deve ser capaz de lidar com situações extremas. Habilidades científicas e técnicas serão sempre colocadas à prática e serão os pontos primordiais para reverter desde possíveis ferimentos até paradas cardíacas, amputações, queimaduras, envenenamento por gás e explosões.

(12) Entre as inúmeras atividades de uma equipe que atua em plataformas ou navios, estão: o atendimento ambulatorial, o controle do estoque de materiais e medicamentos, a higiene do local de trabalho e dos alimentos, a comunicação com o setor médico e, seguramente, os primeiros socorros. Vale destacar que, em casos mais graves, em que há necessidade do atendimento médico, as equipes Offshore também contam com esse tipo de profissional de sobreaviso em terra firme. O contato inicial é feito por telefone ou videoconferência, momento em que os procedimentos são iniciados.

(13) Muitos acreditam que apenas quem possui especialização em Enfermagem do Trabalho pode atuar na área Offshore. Embora tal especialização ajude no bom desempenho, ainda não há obrigatoriedade legal. O que ocorre no mercado é que as empresas terceirizadas, responsáveis por contratar os profissionais, incluem essa formação como requisito.

(14) Os salários atualmente variam entre R\$ 4.500,00 para um enfermeiro iniciante e R\$ 10.000,00, para um enfermeiro nível sênior ou coordenador. Para os técnicos de enfermagem, os valores ficam entre R\$ 3.500,00 e R\$ 6.000,00. Atualmente é uma das áreas mais bem pagas da enfermagem.

Disponível em: <https://aenfermagem.com.br/materia/enfermagem-offshore/> Acesso em: 30 jul. 2018. Adaptado.

01. Todo texto é elaborado tendo em vista um propósito definido. No caso do Texto 1, o autor tem como propósito principal:

- A) criticar as perigosas condições de trabalho dos profissionais de enfermagem que atuam em plataformas petrolíferas.
- B) convencer profissionais de enfermagem a se candidatarem a um curso de especialização em enfermagem offshore.

- C) divulgar os princípios científicos em que se baseia o atendimento de enfermagem a pacientes acidentados em águas profundas.
- D) relatar o cotidiano de profissionais de enfermagem que atuam em navios e plataformas de petróleo.
- E) trazer informações acerca de uma das especialidades de enfermagem, a fim de subsidiar, prioritariamente, os profissionais de enfermagem.

02. O Texto 1 está organizado em tópicos temáticos que se sucedem e ampliam progressivamente o tema. Considerando esse comentário, relacione os tópicos temáticos da coluna 1 aos comentários da coluna 2, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

Coluna 1	Coluna 2
1. Crescimento da demanda	() Atividades de enfermagem que são voltadas para os trabalhadores a bordo de plataformas, navios e unidades petrolíferas.
2. Delimitação do tema	() Atendimento de emergência de grande proporção ou gravidade, já que a exploração de petróleo e gás tem grande periculosidade.
3. Formação profissional	() Devido às grandes descobertas de petróleo e gás no Brasil, os investimentos no setor offshore tiveram um grande crescimento.
4. Jornada de trabalho	() Embora ajude no desempenho, a especialização em Enfermagem do Trabalho não é condição obrigatória para trabalhar em enfermagem offshore.
5. Complexidade do trabalho	() Os profissionais têm turnos de 12 horas de trabalho, em dois tipos de escalas e/ou regime de revezamento de embarque.

A ordem CORRETA, de cima para baixo, é:

- A) 2-3-1-5-4 B) 2-5-1-3-4 C) 3-1-2-4-5 D) 4-2-3-1-5 E) 5-1-3-4-2

03. Analise as relações de sentido propostas a seguir, para determinados segmentos do Texto 1.

1. No segundo parágrafo, a expressão “operações complexas” significa o mesmo que ‘cirurgias complicadas’.
2. O trecho: “o profissional de enfermagem deve possuir um perfil bastante sociabilizável” (8º parágrafo) equivale a: ‘o profissional de enfermagem deve ser uma pessoa bastante generosa’.
3. Em: “sua interação com os demais tripulantes é um fator essencial para gerar relações de confiança” (8º parágrafo), a palavra destacada tem o mesmo sentido que “originar”.
4. Com: “Habilidades científicas e técnicas(...) serão pontos primordiais para reverter (...) paradas cardíacas” (11º parágrafo), o autor quer dizer: ‘Habilidades científicas e técnicas serão cruciais para reanimar pessoas em parada cardíaca’.

Estão CORRETAS, apenas:

- A) 1 e 3. B) 1, 3 e 4. C) 2 e 3. D) 2 e 4. E) 3 e 4.

04. Considerando a rede de relações sintático-semânticas presentes no Texto 1, assinale a afirmativa CORRETA.

- A) No trecho: “A atividade tornou-se tão importante para a área que o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) reconheceu a Enfermagem Offshore como uma nova Especialidade da Enfermagem.” (3º parágrafo), o articulador “tão... que” marca uma relação sintático-semântica de conclusão.
- B) Relações semânticas de causa introduzem e também finalizam o período que forma o oitavo parágrafo do Texto 1; tais relações são marcadas, respectivamente, pelos conectivos “por” e “visto que”.
- C) Ainda no oitavo parágrafo, o segmento “que apresenta situações peculiares” tem valor restritivo: somente as atividades de confinamento apresentam certas especificidades.
- D) Em: “a possibilidade de um atendimento de emergência de grande proporção (...) é provável (...), uma vez que as operações envolvidas na exploração de petróleo e gás têm grande periculosidade (...)” (10º parágrafo), o articulador em destaque estabelece uma relação sintático-semântica de proporcionalidade.
- E) O trecho: “Embora tal especialização ajude no bom desempenho, ainda não há obrigatoriedade legal.” (13º parágrafo) deve ser entendido como: ‘Se a especialização ajudasse mesmo no bom desempenho, a obrigatoriedade legal já teria sido requerida’.

05. Acerca do emprego de elementos que promovem a coesão e a compreensão textual, assinale a alternativa CORRETA.

- A) No trecho: “as atividades dela são voltadas para os trabalhadores a bordo de plataformas, navios e unidades petrolíferas.” (1º parágrafo), o termo destacado refere-se ao segmento “prestação da assistência de enfermagem”.
- B) No trecho: “Isso ocorre devido ao tipo de atividade desenvolvida por esses profissionais” (2º parágrafo), o pronome destacado substitui o segmento “enfermagem do trabalho”.
- C) Em: “O número de profissionais (...) vem crescendo de forma rápida desde então” (5º parágrafo) deve ser entendido como: ‘O número de profissionais (...) vem crescendo de forma rápida desde as grandes descobertas e a exploração de novas reservas de petróleo e gás no Brasil’.
- D) No trecho: “Outras selecionam por contrato de trabalho temporário (...)” (7º parágrafo), a ausência do nome a que se refere o pronome ‘outras’ não impede a recuperação desse substantivo: ‘Outras leis selecionam por contrato de trabalho temporário’.
- E) Em: “O que ocorre no mercado é que as empresas terceirizadas, responsáveis por contratar os profissionais, incluem essa formação como requisito.” (13º parágrafo), o termo ‘essa formação’ refere-se à formação de ‘enfermeiro offshore’.

06. O Texto 1 circula na esfera jornalística e o seu conteúdo se organiza predominantemente:

- A) na exposição de informações acerca do tema, como em: “Os profissionais de Enfermagem Offshore atualmente trabalham em turnos de 12 horas (...)” (6º parágrafo).
- B) na narração de experiências dos profissionais de enfermagem, como em: “Habilidades científicas e técnicas serão sempre colocadas à prática” (11º parágrafo).
- C) na descrição do ambiente físico de trabalho do setor offshore: “Entre as inúmeras atividades de uma equipe que atua em plataformas ou navios, estão: “(...) o atendimento ambulatorial (...), a higiene do local de trabalho e dos alimentos” (12º parágrafo).
- D) no diálogo direto com o leitor, como em: “Muitos acreditam que apenas quem possui especialização em Enfermagem do Trabalho pode atuar na área offshore.” (13º parágrafo).
- E) na defesa das ideias por meio de uma argumentação precisa: “O que ocorre no mercado é que as empresas terceirizadas, responsáveis por contratar os profissionais, incluem essa formação como requisito.” (13º parágrafo).

07. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado está desempenhando uma função adjetiva.

- A) Isso requer habilidades para prestar assistência no caso de lesões graves.
- B) Devido às grandes descobertas da Petrobras, os investimentos cresceram.
- C) Há profissionais de diversas nacionalidades nas operações a bordo.
- D) Os profissionais são posicionados em níveis que variam do nível I ao IV.
- E) São atividades da equipe: atendimento ambulatorial, primeiros socorros (...).

08. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado no qual a concordância está de acordo com a norma culta da nossa língua.

- A) Gasta-se cifras milionárias com a exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas.
- B) Tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem offshore é importante na assistência em alto-mar.
- C) Não se deve desconsiderar os riscos do trabalho em plataformas marítimas em prol de um salário vantajoso.
- D) Novidades sobre a área de enfermagem frequentemente pode ser encontrada no site do Conselho Federal.
- E) Havia quatro anos que aquele enfermeiro tinha decidido abandonar o trabalho em UTI para viver a experiência da área offshore.

09. Em contextos mais formais, ganham força o conhecimento acerca da tradição gramatical, como o emprego da crase; as normas da regência nominal e verbal e da concordância verbal; a colocação pronominal; o emprego da pontuação. Considerando tais aspectos, assinale o enunciado que atende inteiramente à norma-padrão da língua.

- A) Devido à um acordo sindical, criou-se uma escala especial exclusiva para funcionários concursados Petrobras.
- B) Em torno das regiões que houve grandes descobertas de petróleo e gás, surgiram empresas de fomento a pesquisa.
- C) Inúmeras são as variantes que se devem colocar à reflexão na hora de escolher um emprego como a enfermagem offshore.
- D) Entre as inúmeras atividades desenvolvidas em plataformas ou navios, estão o atendimento ambulatorial e o controle do estoque.
- E) Para analisar uma proposta de trabalho em plataformas de petróleo, não pode-se desconsiderar as condições em que esse trabalho se realiza.

Texto 2



Disponível em: <https://www.recadosonline.com/img-39525.html> Acesso em: 12 ago. 2018. Adaptado.

10. Considerando as relações entre as imagens e a parte verbal (formada pelas palavras) do Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. A linha, que sugere o traçado dos impulsos elétricos em um eletrocardiograma, no texto verbal, estabelece relação com a palavra “vida”.
2. A figura representativa, no senso comum, de um coração pode ser associada tanto à afetividade implícita na palavra “cuidado” como à “vida”.
3. Os traços retilíneos no início e no final do traçado remetem à ausência de vida, ou seja, à morte, relação reforçada pela presença das figuras humanas.
4. As figuras humanas de um bebê e de um idoso representam, respectivamente, o início e o fim da vida e, ao lado do texto verbal, colocam a enfermagem como presença constante durante todo o percurso da vida humana.

Estão CORRETAS:

- A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1 e 3, apenas. D) 2 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E SAÚDE COLETIVA

11. Em relação à Lei 8.080/90, analise as assertivas abaixo:

- I. Descreve em seu Art. 2º, § 1º que o Estado tem o dever de garantir a saúde à população, limitando a sua ação apenas na formulação de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- II. No § 2º, garante o acesso privilegiado às ações e aos serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. De acordo com a Lei 8.080/90, os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas. D) Apenas I está incorreta.
 B) I, II e III estão incorretas. E) Apenas I e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.

12. Em relação ao Art. 4º, da Lei 8.080/90, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O SUS é constituído por conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
 () Estão também incluídas como prestadoras as instituições de pesquisa e de controle de qualidade.
 () A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) F-V-F E) V-V-F

18. Em relação ao Pacto pela Saúde de 2006, analise as assertivas abaixo:

- I.** Um de seus fundamentos foi baseado na definição de compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- II.** É composto pelo Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
- III.** Destaca a eficiência do Estado Brasileiro no controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
- B) I, II e III estão incorretas.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas II está incorreta.
- E) Apenas I e III estão incorretas.

19. Promoveu um “choque” de descentralização, acompanhado da desburocratização dos processos normativos. Estamos tratando

- A) do Pacto pela vida.
- B) do Pacto em defesa do SUS.
- C) do Pacto de gestão do SUS.
- D) da Constituição Federal.
- E) da Política Nacional de Atenção Básica.

20. No Brasil, saúde e cidadania estão intimamente ligadas. Isso se dá a partir do princípio da participação popular do SUS. Com base nessa afirmação, analise as assertivas abaixo:

- I.** A Lei Nº 8.142/90 é a mais específica quanto à participação popular.
- II.** O termo “instâncias colegiadas”, largamente empregado no SUS, se refere à forma de gestão na qual uma decisão é tomada por um grupo.
- III.** O controle social vai além da função de vigilância e envolve, também, o dever de cobrar e auxiliar na efetividade e no comprometimento daqueles que fornecem os serviços de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
- B) I, II e III estão incorretas.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas II está incorreta.
- E) Apenas I e III estão incorretas.

21. Sobre o controle social do SUS, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Participam do Conselho de Saúde representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- () As Conferências de Saúde se reúnem ordinariamente a cada dois anos, para viabilizar mecanismos de associação e parceria entre entes públicos e privados e fiscalizar atuação dos poderes legislativo e executivo no âmbito da saúde.
- () É vedado aos conselhos de saúde parcerias com universidades e instituições de pesquisa, devendo todo tipo de iniciativa nesse sentido ser viabilizado pelo gestor de saúde da esfera correspondente.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) V-F-F E) V-V-F

22. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria 2.436/2017, se constitui como uma grande conquista para o SUS. Sobre essa Política, analise as assertivas abaixo:

- I.** Finalmente considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como não equivalentes, estabelecendo diferenças claras entre eles.
- II.** Estabelece que serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos na portaria e tenham caráter transitório.
- III.** Estabelece como responsabilidade comum a todas as esferas de governo garantir espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
- B) I, II e III estão incorretas.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas I está incorreta.
- E) Apenas I e III estão incorretas.

- () O IMC é considerado um bom marcador de adiposidade em crianças. Existem evidências da associação dos valores do IMC em crianças menores de 2 anos com obesidade na adolescência e na idade adulta e, por isso, recomenda-se a avaliação desse indicador desde o nascimento. Crianças menores de 5 anos com valores de IMC entre +2 e +3 escores “z” são consideradas obesas para a idade.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-F-F-F B) V-F-V-F C) F-V-V-V D) V-F-V-V E) F-F-F-V

31. Sobre os Programas de Atenção ao Idoso, analise as assertivas abaixo:

- I. A Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa define como uma de suas prioridades a construção de uma proposta de Modelo de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, com o objetivo de contribuir para a organização da atenção e ampliação do acesso qualificado a essa população no âmbito do SUS.
- II. O Modelo de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa apresenta as diretrizes e estratégias para potencializar ações e serviços dirigidos às pessoas idosas já desenvolvidas nos territórios, de forma que sejam reconhecidos e articulados diferentes pontos de atenção, compondo a rede de atenção às pessoas idosas, tendo a Atenção Básica como coordenadora dessa ação.
- III. A atenção deve ser baseada nas necessidades da população, direcionada ao indivíduo, considerando sua integração na família e na comunidade, centrada exclusivamente na doença.
- IV. A especificidade e a heterogeneidade nos processos de envelhecer devem ser consideradas, a partir dos determinantes sociais da saúde, nos seus mais diferentes aspectos, considerando ainda as diferenças de gênero e raça, buscando a equidade e resolutividade do cuidado a ser ofertado.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV. B) I, II e IV, apenas. C) I e IV, apenas. D) II, III e IV, apenas. E) III e IV, apenas.

32. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada ou síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) ainda representam importante preocupação para a saúde pública. Quanto a essa patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. O HIV-1 e o HIV-2 são adenovírus da família *Lentiviridae*, necessitando, para se multiplicar, de uma enzima denominada transcriptase reversa, responsável pela transcrição do ácido ribonucleico (RNA) viral para uma cópia do ácido desoxirribonucleico (DNA), que pode, então, se integrar ao genoma do hospedeiro.
- II. Os indivíduos com infecção muito recente (“infecção aguda”) ou imunossupressão avançada têm menor concentração do HIV no sangue (carga viral baixa) e nas secreções sexuais, diminuindo a transmissibilidade do vírus.
- III. O vírus HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal), pelo sangue (via parenteral e de mãe para filho) e pelo leite materno.
- IV. O tratamento da aids com medicação antirretroviral (TARV) foi revolucionário para a pandemia, tem ação na redução da carga viral e reativação do sistema imunológico, levando à cura da doença.

Estão CORRETAS apenas

- A) I, II e III. B) I e IV. C) I e II. D) II e IV. E) I e III.

33. Um paciente do sexo masculino, 70 anos, foi admitido no pronto-atendimento de uma unidade de saúde, referindo vômitos com sangue e fezes escuras de odor forte a, pelo menos, 04 dias. O paciente informa ainda que, nas últimas 24 horas, os episódios de vômito com sangue aumentaram em número de vezes. Ao exame, refere ser etilista, encontra-se descorado, algo desorientado e com os sinais vitais mantidos. Conforme o caso descrito, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A sintomatologia apresentada sugere o diagnóstico de hemorragia digestiva baixa, e, para impedir o choque hipovolêmico, a principal intervenção de enfermagem é a ingestão hídrica para reposição.
- B) O planejamento da assistência de enfermagem deve conter as seguintes intervenções: instalar sonda nasogástrica para lavagem gástrica e controle de drenagem, instalar venóclise para reposição volêmica, verificar os sinais vitais, avaliar o resultado dos exames hematológicos e da bioquímica, ficar atento à necessidade de reposição de sangue e derivados e de eletrólitos. O uso de anticoagulantes deve ser iniciado precocemente para amenizar o risco de embolia.
- C) Para o diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta, o principal critério utilizado é a verificação através da endoscopia digestiva, se o sangramento está localizado abaixo do Ligamento de Treitz.

- D) Para a definição de choque hipovolêmico com perda de volume intravascular de 15 a 20 % e para a tomada de decisão do enfermeiro em relação à conduta mais adequada perante esse sintoma clínico, o paciente deve apresentar uma queda na pressão arterial sistólica de 10 mmHg ou mais, aumento da frequência de pulso de 20 batimentos/min. ou mais, em ortostatismo.
- E) Deve fazer parte das intervenções de enfermagem o posicionamento do paciente no leito, em decúbito dorsal, após a instalação da sonda nasogástrica que deverá permanecer fechada, considerando a finalidade da instalação.

34. Sobre Hanseníase, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Trata-se de uma doença crônica infecciosa, cujo agente patológico é o *Mycobacterium Leprae*, um bacilo álcool resistente, fortemente gram-positivo.
- B) É transmitida por contato próximo e rápido de uma pessoa susceptível, com um doente que seja portador de hanseníase.
- C) São sinais e sintomas da hanseníase: manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas, formigamento, choques e câimbras nos braços e pernas.
- D) A hanseníase multibacilar é a forma da doença em que o sistema consegue destruir os bacilos espontaneamente, podendo acometer crianças.
- E) A sensibilidade tátil e a dolorosa são frequentemente as primeiras a serem perdidas, devendo se buscar as diferenças de sensibilidade sobre a área a ser examinada e a da pele normal.

35. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), leia as afirmações abaixo:

- I. A medida da pressão arterial (PA) deve ser realizada em toda avaliação de saúde por profissionais habilitados. É recomendado, pelo menos, que a PA seja medida a cada 3 anos para os adultos com $PA \leq 120/80$ mmHg, e a cada 2 anos, para aqueles com $PA > 120/80$ mmHg e $< 140/90$ mmHg.
- II. Na busca do diagnóstico de HAS, faz-se necessária uma avaliação clínica. Ao realizar o exame físico, o enfermeiro verifica peso, altura, circunferência abdominal e frequência cardíaca. A palpação e a ausculta do coração, das carótidas e dos pulsos devem fazer parte do exame.
- III. O tratamento medicamentoso da HAS tem como objetivo diminuir a mortalidade cardiovascular. Os diuréticos apresentam mecanismos de ação anti-hipertensiva associados aos seus efeitos natriuréticos, com diminuição do volume extracelular. Seus principais efeitos adversos são: fraqueza, câimbras, hipovolemia e disfunção erétil.
- IV. A hipertensão arterial na gestação resulta em mortalidade entre 20% e 25% de todas as causas de óbito materno. A pré-eclâmpsia é definida pela presença de HA após a 20ª semana associada à proteinúria significativa. Na ausência de proteinúria significativa, o diagnóstico pode ser baseado na presença de cefaleia, elevação de enzimas hepáticas, turvação visual, dor abdominal, plaquetopenia, comprometimento renal e edema pulmonar.

Estão CORRETAS

- A) II e III, apenas. B) I e IV, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I, II, III e IV. E) II e IV, apenas.

36. L.O, 19 anos foi atendida em uma unidade de saúde. Ao ser examinada pela enfermeira, Clarisse referiu perda de peso, visão turva, fraqueza e cefaleia que evoluiu com anorexia, náusea, 3 episódios de vômito nas últimas 3 horas, pele seca e fria, facies hiperemiada, hálito cetônico, constatado pelo avaliador, e dor abdominal. Quais procedimentos de enfermagem devem ser adotados para esse paciente?

- A) O enfermeiro identifica os sinais de cetoacidose, hiperglicemia < 200 mg/dl e $pH > 7,30$, e cetonúria importante, caracterizando o distúrbio metabólico e, de imediato, transfere o paciente para unidade hospitalar de alta complexidade.
- B) Em associação aos sintomas descritos no caso relatado, a paciente pode apresentar respiração ofegante e bradispmia causada pela hipoglicemia, sendo importante, no plano de assistência de enfermagem, estar prescrito verificação da pressão arterial a cada 8 horas.
- C) Na CAD leve, deve-se iniciar a hidratação com Soro fisiológico a 0,9%, 03 litros na primeira hora, conforme prescrição médica, e o tratamento insulínico para compensar a cetose só deverá ser iniciado após o controle metabólico com altas doses de insulina administrada rapidamente por via endovenosa.
- D) Considerando que o paciente em cetose diminui a degradação de gordura e aumenta a produção de glucagon, causando poliúria e por consequência desidratação e dor abdominal, o balanço hídrico do paciente em cetose deve ser realizado a cada 12 horas.
- E) Um dos sinais de complicação da cetoacidose diabética (CAD) é o aumento da frequência respiratória que pode levar à respiração de Kussmaul como tentativa do próprio organismo em diminuir a acidose, portanto o plano de intervenção de enfermagem deve conter um controle e monitorização rigorosa dos sinais vitais.

37. O sistema da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) vem sendo desenvolvido como um elemento norteador da assistência de enfermagem. Sobre a SAE, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A SAE é um processo que permite integrar as ações docente-assistenciais, porém só é considerada uma estratégia de aprendizado para alunos de graduação e pós-graduação, desfavorecendo o próprio corpo de enfermagem da instituição.
- B) A SAE enquanto método de resolução de problemas possui quatro (investigação, diagnóstico, planejamento e avaliação) fases direcionadas para uma rápida identificação e solução dos problemas encontrados.
- C) O histórico de enfermagem deve ser organizado, definindo-se quais dados são significativos e necessitam ser investigados, sendo eles provenientes da percepção do enfermeiro, paciente e familiares, outros membros da equipe de saúde, resultados de exames e da propedêutica proposta.
- D) A SAE não exige necessariamente a padronização de terminologia de enfermagem para descrever, comparar e comunicar os cuidados de enfermagem.
- E) A terceira etapa da SAE, o planejamento da assistência de enfermagem, é também a principal etapa do Processo de Enfermagem, pois consiste em estabelecer prioridades frente aos diagnósticos de enfermagem.

38. Uma das preocupações do Enfermeiro é o aprimoramento da aplicação diária da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Sobre a SAE, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A anamnese e o exame físico compõem o histórico de Enfermagem, uma das 3 etapas da SAE.
- () A anamnese e o exame físico representam um instrumento de grande valia para a assistência, permitindo ao enfermeiro realizar diagnósticos e planejar ações.
- () A SAE tem suas origens no Processo de Enfermagem, e a legislação brasileira ratifica isso através da Lei do exercício Profissional, Lei Nº 7.498/1986 – Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987, que dispõe que ao enfermeiro incumbe: sistematizar, individualizar, administrar e assumir o papel de prestador do cuidado de enfermagem junto com a equipe.
- () Com aplicação da SAE, o processo de cuidar em enfermagem torna-se mais amplo, mediante planejamento ainda mais individualizado e holístico, mantendo o conhecimento científico como âncora desse cuidado. Para isso, é imprescindível o levantamento sistematizado dos dados, ou seja, a anamnese do paciente, realizada na admissão ou na Consulta de Enfermagem.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F-F-V-V
- B) V-F-F-V
- C) V-V-V-V
- D) V-F-F-F
- E) F-V-V-V

39. Sobre a Consulta de Enfermagem (CE) na estratégia saúde da família, assinale a afirmativa CORRETA.

- A) Como prestação de assistência, pode ser realizada pelo profissional de saúde tanto para o indivíduo sadio quanto para aquele que se encontra hospitalizado.
- B) Tem o objetivo de prestar assistência empírica de enfermagem, identificando os problemas de saúde-doença, executando e avaliando cuidados que contribuam para a reabilitação da saúde.
- C) É capaz de dar respostas às complexidades do indivíduo, com base em um saber acumulado de disciplinas que desvendam também relações humanas.
- D) De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, a consulta de enfermagem não deve ser obrigatória na atenção básica e, sim, em instituições hospitalares públicas e privadas.
- E) Não requer mudanças na prática assistencial do enfermeiro, para que este compreenda sua complexidade, metodologia própria e objetivos definidos.

40. O Ministério da Saúde reformulou, através da Portaria Nº 1.600/2011, a Política Nacional de Atenção às Urgências e instituiu a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre essa temática, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos do sistema municipal e distrital de saúde, com a finalidade de ampliar e qualificar o acesso dos usuários em situação de urgência e emergência aos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.
- B) São diretrizes da Rede de Atenção às Urgências: a promoção, prevenção e vigilância à saúde; o Fortalecimento da Força Nacional do SUS e a ampliação do atendimento domiciliar.
- C) São destacadas como prioridades da Rede de Atenção às Urgências as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.
- D) O prazo para a completa implantação e implementação da Rede de Atenção às Urgências em todo o território nacional é final de 2020. Os Estados e Municípios que não cumprirem essa meta serão descredenciados.
- E) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências têm como objetivo prestar atendimento às vítimas de agravos de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica que não possam condições de se deslocarem sozinhas para um serviço de saúde qualificado.

41. As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) consistem em Eventos Adversos (EA) ainda persistentes nos serviços de saúde. Sabe-se que as infecções elevam consideravelmente os custos no cuidado do paciente, além de aumentar o tempo de internação, a morbidade e a mortalidade nos serviços de saúde. Existem algumas medidas preventivas específicas, que devem ser gerenciadas em conjunto para prevenir as pneumonias relacionadas à assistência à saúde, especialmente a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica. Partindo desse pressuposto, analise as afirmativas abaixo:

- | | |
|------|--|
| I. | Manter decúbito elevado (30- 45°). |
| II. | Adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea. |
| III. | Aspirar secreção subglótica rotineiramente. |
| IV. | Fazer a higiene oral com antissépticos. |
| V. | Fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares. |

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e II, apenas. B) I, II e III, apenas. C) I e IV, apenas. D) V, apenas. E) I, II, III, IV e V.

42. No Brasil, 1,5 milhões de novos casos de Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) ocorrem anualmente em crianças menores de cinco anos, sendo a primeira causa de internações dessas crianças em todas as regiões do país. Sobre crianças com pneumonia, leia as afirmações abaixo:

- | | |
|------|---|
| I. | O conhecimento dos fatores de risco para a hospitalização por pneumonia permite identificar aspectos a serem priorizados na prevenção e no manejo da doença. Tais fatores incluem: sexo, idade, peso ao nascer, amamentação, desnutrição, morbidade prévia e atual, uso de medicamentos, saneamento básico, poluição intra e extradomiciliar, cuidado da criança fora de casa e acesso a serviços de saúde. |
| II. | A criança chega à Unidade Básica de Saúde (UBS), com cianose central, dificuldade respiratória grave e incapacidade de ingerir líquidos. Essa criança é classificada com pneumonia muito grave. A conduta é administrar a dose de ataque do antibiótico ainda na UBS e, em seguida, encaminhar urgente para um hospital de referência. |
| III. | Quando a criança apresenta situações vacinais desatualizadas, há um maior risco de hospitalização por pneumonia. As vacinas contra o vírus influenza e contra o <i>Streptococcus pneumoniae</i> conferem proteção específica. |
| IV. | Ao avaliar um paciente com pneumonia, através do histórico de enfermagem e do exame físico, o enfermeiro identifica: alteração de temperatura e do pulso; quantidade, odor e coloração das secreções, frequência e intensidade da tosse; alteração nos achados físicos, através da inspeção e da ausculta torácica. |

Estão CORRETAS

- A) I e IV, apenas. D) III e IV, apenas.
 B) I, II, III e IV. E) I, III e IV, apenas.
 C) II e III, apenas.

43. Sobre a Consulta de Enfermagem (CE) na Atenção Básica, leia as afirmações e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- | | |
|-----|---|
| () | A CE para pessoas com pressão arterial limítrofe tem o objetivo de trabalhar o processo de educação em Saúde para a prevenção primária da doença, por meio do estímulo à adoção de hábitos saudáveis de vida e de avaliar e estratificar o risco para doenças cardiovasculares. |
| () | Na CE, na UBS, o enfermeiro deve orientar a importância da mudança do estilo de vida (MEV) e que essas mudanças sejam iniciadas no nível pressórico de pressão arterial (PA) limítrofe, pois, se existirem fatores de risco associados, como diabetes mellitus e obesidade, o risco de apresentar hipertensão no futuro é altíssimo. |
| () | Na CE para a estratificação de risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos dez anos. Essa estimativa se baseia na presença de múltiplos fatores de risco, como sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo, níveis de HDLc e LDLc. |
| () | A CE para o acompanhamento da pessoa com HAS deve focar nos fatores de risco que influenciam o controle da hipertensão, como as mudanças no estilo de vida, o incentivo à atividade física, à redução do peso corporal quando acima do IMC recomendado e o abandono do tabagismo. |

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V-V B) V-F-F-V C) F-F-F-V D) F-V-V-V E) V-V-F-F

44. A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma das afecções mais comuns do trato gastrointestinal, podendo ser bastante incômoda para o paciente acometido. Quanto ao planejamento da assistência de enfermagem para essa condição clínica, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () As metas para o planejamento da assistência se relacionam a aliviar a dor abdominal, controlar a diarreia ou constipação e reduzir o estresse.
- () Dentre as intervenções de enfermagem, estão as orientações quanto à alimentação em horários regulares e à importância da mastigação lenta.
- () O paciente deve ser estimulado a ingerir muito líquido, inclusive no horário das refeições, pois ajuda a digestão e, com isso, reduz a possibilidade de distensão abdominal.
- () Para os pacientes que desenvolvem constipação intestinal, o exercício físico não é recomendado, para não estimular a dor.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-F-F
- B) V-F-V-V
- C) F-V-V-V
- D) V-F-F-F
- E) F-F-V-V

45. Sobre o Edema Agudo de Pulmão (EAP), leia as afirmações abaixo:

- I.** As consequências do edema variam em gravidade, de acordo com a magnitude do volume do edema, relacionando-se diretamente com o grau de disfunção celular, decorrente da menor difusão de oxigênio para a célula.
- II.** Em geral, o diagnóstico é feito com o exame físico detalhado, avaliando (taquipneia, creptante, taquicardia, angústia), raios-X de tórax, eletrocardiograma, podendo ainda ser confirmado através do ecocardiograma.
- III.** O uso de diurético é indicado para a resolução do excesso de volume. Ventilação não invasiva ou também a intubação pode ser necessária.

Está CORRETO que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, II e III.

46. Sobre cetoacidose, leia as afirmativas abaixo:

- I.** É a complicação mais grave da Diabetes Mellitus tipo II, com uma mortalidade baixa.
- II.** As alterações metabólicas presentes na cetoacidose podem ser compreendidas como uma exacerbação que normalmente ocorre no jejum.
- III.** A cetoacidose é marcada por três achados clínicos: hipoglicemia, cetonemia e acidose metabólica.
- IV.** A cetoacidose também pode ser encontrada nos casos de diabetes secundário, como ocorre em algumas doenças endócrinas, ex: acromegalia, Cushing, hipertireoidismo entre outras doenças.

Estão CORRETAS

- A) II e IV.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) I e IV.
- E) III e IV.

47. A apendicite é uma doença frequente. Sua maior ocorrência encontra-se no sexo masculino, especialmente em crianças e adolescentes. Sobre essa doença, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A etiopatogenia da doença pode ser atribuída a fatores, como obstrução mecânica, dieta inadequada de fibras, suscetibilidade familiar, estrutura populacional e patógenos diversos.
- B) O tratamento da apendicite é sempre clínico e não requer internação.
- C) A principal complicação da apendicite é o aneurisma da aorta abdominal.
- D) A cirurgia videolaparoscópica é contraindicada para o tratamento da apendicite.
- E) A dispnéia é um sinal clínico frequentemente encontrado em crianças em pós-operatório de apendicectomia.

48. O pneumotórax é uma coleção de ar no espaço pleura. O hemotórax é o acúmulo de sangue e de fluidos na cavidade pleural entre as pleuras visceral e parietal, geralmente como resultado de um trauma, podendo ser causado, também, por outros processos inflamatórios. A drenagem torácica está indicada tanto na terapêutica do pneumotórax como na do hemotórax. Sobre drenagem torácica, leia as afirmações abaixo:

- I.** Um dreno de grande calibre é usado para remover grandes quantidades de fluidos ou de sangue e grandes quantidades de ar. O sistema mais simples de drenagem fechada é a unidade de uma câmara. A câmara serve como um coletor de líquido e um vedante de água.
- II.** Durante a respiração normal, expiração e inspiração, o líquido na câmara sobe e desce. Uma câmara única é usada para grandes quantidades de drenagem como nos empiemas.
- III.** O uso de duas câmaras possibilita que qualquer fluido saia para a câmara de coleta, à medida que o ar flui para dentro da câmara de selo d'água. Duas câmaras permitem a medição mais precisa de drenagem torácica e são usadas quando quantidades maiores de drenagem torácica são esperadas.
- IV.** O sistema de drenagem deve ser mantido patente e livre, prevenindo o acúmulo de fluido na cavidade torácica. A presença de coágulos no tubo aumenta os riscos de infecção, atelectasia e pneumotórax hipertensivo.

Estão CORRETAS apenas

- A) I e II. B) I, II e III. C) II e IV. D) I, III e IV. E) I, II e IV.

49. A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é definida como uma condição súbita e inesperada, configurada por incapacidade mecânica cardíaca e consequente deficiência absoluta de oxigenação tissular, confirmada pela perda súbita da consciência, ausência de respiração ou respiração anormal (“gasping”) e ausência de pulso.

Sobre a assistência à vítima desse evento, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A monitorização da vítima de PCR deve ocorrer precocemente, seja com equipamento desfibrilador automático externo (DEA) ou monitor convencional. Quando a PCR for derivada de uma fibrilação ventricular ou atividade elétrica sem pulso, considerados ritmos chocáveis, a conduta da equipe é desfibrilar com choque único.
- () Em vítimas de PCR, a reanimação cardiopulmonar deverá ser iniciada com a aplicação de 30 compressões cardíacas, seguida por 2 insuflações ventilatórias eficientes por minuto. Esse procedimento deve ser realizado em ciclos de dois minutos, seguidos da avaliação da presença/ausência de pulso.
- () Dentre as causas associadas potencialmente reversíveis de PCR, estão: hipovolemia, hipóxia, hipotermia e infarto agudo do miocárdio.
- () Após instalação da via aérea avançada na vítima de PCR, a equipe deverá realizar 30 compressões torácicas e aplicar de 8 a 10 insuflações/minuto, checando o pulso a cada 2 minutos.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V-V B) V-F-V-F C) F-V-V-V D) F-V-F-V E) F-F-F-V

50. Sobre a prevenção de transmissão vertical de sífilis, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Na gestação, tratamentos não penicilínicos são inadequados e só devem ser considerados como opção nas contra-indicações absolutas ao uso da penicilina. Para as gestantes comprovadamente alérgicas à penicilina, recomenda-se a dessensibilização em serviço terciário.
- () Critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais devem ser a base para o diagnóstico da sífilis congênita precoce na criança. Além da prematuridade e do baixo peso ao nascimento, as principais manifestações clínicas são: hepatomegalia, lesões cutâneas, periostite, pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório, icterícia, anemia e linfadenopatia generalizada.
- () Todos os RN nascidos de mães com diagnóstico de sífilis na gestação ou no parto, ou na suspeita clínica de sífilis congênita, não devem realizar a investigação para sífilis congênita; os RN só devem ser investigados a partir do momento em que apresentarem sintomatologia.
- () Durante o segmento clínico e laboratorial da Sífilis congênita, após a confirmação diagnóstica, o caso deve ser notificado, as consultas ambulatoriais devem ser mensais até o 6º mês de vida e bimensais do 6º ao 12º. Os testes não treponêmicos devem acontecer no 1º, 3º, 6º, 12º e 18º meses de idade, interrompendo o segmento após dois exames não treponêmicos consecutivos e negativos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F-F-V-V B) F-F-F-V C) V-V-V-F D) V-F-V-F E) V-F-V-V

**ENFERMEIRO POLICLÍNICA / MATERNIDADE PLANTONISTA (30)
/ ENFERMEIRO PLANTONISTA SAMU / ENFERMEIRO USB (30)**