



## LÍNGUA PORTUGUESA

## Texto 1

## Para de fumar, meu filho

- (1) A médica gritou para que deitassem minha mãe no chão e, para o meu horror, começaram a fazer massagem cardíaca. Não quis continuar vendo. E quando voltei, disseram simplesmente que ela havia parado. Não disseram: ela morreu, ela faleceu. Usaram uma figura de retórica médica: sua mãe parou. Havia quase meio ano que eu não fumava. Saí dali, atravessei a rua e comprei uma carteira de cigarros. Os meus irmãos e irmãs, avisados, se puseram a caminho. Eu sabia que minha velhinha, internada naquela clínica, podia morrer, mas jamais imaginei testemunhar a brutalidade daquela cena. Depois, sentei num banco de jardim nos fundos no pátio da clínica, e ali comecei a chorar e a fumar.
- (2) Havia quase seis meses que eu não fumava, a morte repentina da minha mãe me fez voltar coberto de "direitos". Logo criei justificativas filosóficas para continuar fumando: somos um grão de areia, uma casquinha de noz nas águas injustas e revoltas da vida, a chama se apaga a qualquer momento, o que adianta não comer ovos estrelados, derretendo em cima do pão fresquinho. De que que adianta a ingesta do abominável repolho cru, que é bom para os intestinos, de que adianta não fumar? – me perguntava inflado de razões tabagistas. – Dane-se, *fuck you* os médicos, a medicina – e dava tragadas revoltadas olhando para a brasa do cigarro enquanto as lágrimas escorriam.
- (3) Passado o primeiro impacto da perda, segui fumando, mas mantinha certo controle para não explodir a quantidade de cigarros como antes. Num belo dia lembrei um fato aparentemente isolado. Lembrei que no período em que fiquei sem fumar, fui tomado de uma alegria aparentemente injustificada. Vivía mais alegre pelo simples fato de ter vencido uma batalha em que a maioria fracassa. Algo difícil de ser entendido por quem nunca fumou. Ser mais feliz por não fumar. Isso, sim, que é um raro prazer de impossível tradução.
- (4) O que quer que eu diga? Parar e não voltar a fumar é como voltar da guerra vivo e vitorioso. É como acordar os sentidos que estavam hibernando e sentir um novo suprimento de energia vital invadir cada canto, canto redondo, digamos, do corpo e do cérebro, como se o ato de respirar desse barato.
- (5) Uns três meses depois, voltei à clínica onde minha mãe havia morrido, não sei por que, (e estou farto de saber). Fui lá para me desassombrar, para racionalizar o cenário, falar com as pessoas de novo, gastar, gastar tudo aquilo por que passei. Após algumas conversas constrangidas, comecei a me dar conta de que ninguém da clínica queria falar comigo sobre o assunto, para eles, profissionais, era página virada. Mas quando saí, uma enfermeira me acompanhou até o portão de entrada e me contou com naturalidade um fato que me deixou estarecido. Me disse que no dia em que morreu, minha mãe teria dito a ela: "... se me acontecer alguma coisa, diz para o meu filho Paulo não voltar mais a fumar, ele fica tão feliz quando não está fumando...".
- (6) Isso já faz três meses, e há três meses que não voltei a fumar nem mais um cigarro. Não por achar que recebi uma mensagem amorosa do além. Mas porque a minha mãe também havia notado que eu andava estremeado por uma nova alegria depois que havia parado de fumar.
- (7) Se quiser fumar, fume, esta é uma decisão profundamente solitária e íntima. Melancolia, solidão, estresse, medo e raiva combinam com cigarro. Difícil, quase impossível, é fazer que o fumante entenda que o cigarro é um ente "mágico", e é, e que, em vez de permitir que você lute contra os problemas existenciais, ou mesmo do dia a dia, o maldito cigarro "costura" essas sensações na sua alma, de modo a lhe proporcionar prazer na melancolia, bem-estar na solidão, adrenalina no estresse, e uma coragem diante do medo que só dura o tempo que o cigarro queima. Em seguida, tem que acender outro.

Paulo Tiaraju. Disponível em: <http://coletiva.net/artigos/-para-de-fumar-meu-filho,297057.jhtml>. Acesso em: 10 abr. 2019. Adaptado.

**01. Para compreender globalmente o Texto 1, o leitor deve considerar que o autor tem como propósito principal:**

- A) comover os leitores, pois a morte é um tema que sempre envolve emoção e dor.
- B) convencer o leitor a abandonar o fumo com base em fatos e argumentos científicos.
- C) dividir com os leitores o sofrimento de acompanhar os momentos finais de sua mãe.
- D) partilhar uma experiência pessoal e transformadora que pode influenciar o leitor.
- E) trazer para os seus leitores as informações mais recentes sobre os efeitos do cigarro.

**02. A surpreendente razão que motivou o autor a abandonar o fumo foi:**

- A) a certeza de que algumas de suas justificativas eram só desculpas.
- B) a consciência de que sua mãe morreu em decorrência do fumo.
- C) a descoberta do mal que o fumo causa à saúde das pessoas.
- D) o fato de sua mãe ter-lhe feito esse pedido no leito de morte.
- E) a percepção de como se sentia alegre quando deixava de fumar.

03. A certa altura do texto, o autor consegue a atenção do leitor ao apresentar argumentos simplórios, empregados comumente para explicar um comportamento discutível. No texto, tais argumentos estão reunidos sob a expressão:

- A) “figura de retórica” (1º parágrafo).
- B) “justificativas filosóficas” (2º parágrafo).
- C) “fato aparentemente isolado” (3º parágrafo).
- D) “mensagem amorosa do além” (6º parágrafo).
- E) “problemas existenciais” (último parágrafo).

04. Releia o 3º parágrafo.

Passado o primeiro impacto da perda, segui fumando, mas mantinha certo controle para não explodir a quantidade de cigarros como antes. Num belo dia lembrei um fato aparentemente isolado. Lembrei que no período em que fiquei sem fumar, fui tomado de uma alegria aparentemente injustificada. Vivia mais alegre pelo simples fato de ter vencido uma batalha em que a maioria fracassa. Algo difícil de ser entendido por quem nunca fumou. Ser mais feliz por não fumar. **Isso**, sim, que é um raro prazer de impossível tradução.

Preencha a lacuna a seguir com o trecho que substitui o pronome “Isso” (destacado), completando-lhe o sentido em conformidade com o texto.

\_\_\_\_\_ (...) é um raro prazer de impossível tradução.

O trecho que completa a lacuna em conformidade com o texto é:

- A) “Ser mais feliz por não fumar”.
- B) “ter vencido uma batalha em que a maioria fracassa.”
- C) “lembrar um fato aparentemente isolado”.
- D) “não explodir a quantidade de cigarros como antes”.
- E) “seguir fumando, mas manter certo controle”.

05. Releia o último parágrafo do Texto 1.

Se quiser fumar, fume, esta é uma decisão profundamente solitária e íntima. Melancolia, solidão, estresse, medo e raiva combinam com cigarro. Difícil, quase impossível, é fazer que o fumante entenda que o cigarro é um ente "mágico", e é, e que, em vez de permitir que você lute contra os problemas existenciais, ou mesmo do dia a dia, o maldito cigarro "costura" essas sensações na sua alma, de modo a lhe proporcionar prazer na melancolia, bem-estar na solidão, adrenalina no estresse, e uma coragem diante do medo que só dura o tempo que o cigarro queima. Em seguida, tem que acender outro.

Acerca das diversas relações que concorrem para o estabelecimento dos sentidos nesse parágrafo, analise as afirmativas a seguir.

- 1 O autor se contradiz ao construir uma ideia positiva do cigarro quando afirma que o fumo promove “prazer na melancolia” e “bem-estar na solidão”.
2. O segmento destacado em: “o maldito cigarro ‘costura’ essas sensações na sua alma (...)” deve ser compreendido como ‘prende esses sentimentos no seu íntimo’.
3. O segmento “essas sensações” resume a sequência: “Melancolia, solidão, estresse, medo e raiva”.
4. No trecho: “(...) e uma coragem diante do medo que só dura o tempo que o cigarro queima. Em seguida tem que acender outro.”, o autor argumenta contra o cigarro mostrando que ele proporciona apenas soluções efêmeras.

Estão CORRETAS:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

06. Ao falar ou escrever, costumamos utilizar tipologias diferentes de textos, conforme os nossos objetivos. O autor do Texto 1, ao decidir incluir um relato em seu texto, precisou empregar a tipologia narrativa em certos trechos, como:

- A) “Para de fumar, meu filho”. (título)
- B) “A médica gritou para que deitassem minha mãe no chão e, para o meu horror, começaram a fazer massagem cardíaca.” (1º parágrafo)
- C) “Se quiser fumar, fume, esta é uma decisão profundamente solitária e íntima.” (último parágrafo)

- D) “Melancolia, solidão, estresse, medo e raiva combinam com cigarro.” (**último parágrafo**)  
 E) “(...) em vez de permitir que você lute contra os problemas existenciais, (...) o maldito cigarro ‘costura’ essas sensações na sua alma (...)”. (**último parágrafo**)

**07. Analise as relações de sentido propostas a seguir.**

1. Ao empregar a expressão “sua mãe parou” (**1º parágrafo**) para comunicar o falecimento de uma paciente, o profissional da área médica opta por um termo do jargão médico mas também tenta atenuar o peso da notícia.
2. No trecho: “a morte repentina da minha mãe me fez voltar coberto de ‘direitos’” (**2º parágrafo**), o segmento destacado deve ser compreendido como “cheio de justificativas”.
3. No trecho: “sentir um novo suprimento de energia vital invadir cada canto, canto redondo, digamos, do corpo e do cérebro (...)”, o acréscimo do adjetivo “redondo” à palavra “canto” (destacado) faz referência à forma mais comum dos órgãos do corpo humano.
4. Em: “Parar e não voltar a fumar é como voltar da guerra vivo e vitorioso.” (**4º parágrafo**), o autor faz uma comparação em que o termo “voltar da guerra” significa o mesmo que ‘encerrar um longo período de vício no fumo’.

**Estão CORRETAS:**

- A) 1, 2 e 3, apenas.  
 B) 1, 2 e 4, apenas.  
 C) 2 e 4, apenas.  
 D) 3 e 4, apenas.  
 E) 1, 2, 3 e 4.

**08. No enunciado: “Fui lá para me desassombrar, para racionalizar o cenário (...)” (**5º parágrafo**), os segmentos destacados estabelecem com o segmento introdutório uma relação sintático-semântica de**

- A) causa.                      B) conformidade.                      C) consequência.                      D) finalidade.                      E) hipótese.

**09. Quanto a alguns aspectos formais do Texto 1, analise as proposições abaixo.**

1. O enunciado: “Havia quase seis meses que eu não fumava.” (**2º parágrafo**) também estaria de acordo com a norma-padrão se formulado nos termos: ‘Faziam quase seis meses que eu não fumava’.
2. O enunciado: “Num belo dia lembrei um fato aparentemente isolado.” também cumpriria as normas da regência verbal se formulado nos termos: ‘Num belo dia me lembrei de um fato aparentemente isolado.
3. O trecho: “Uns três meses depois, voltei à clínica (...)” (**5º parágrafo**) também estaria correto quanto ao emprego da crase em: ‘Uns três meses depois, cheguei à clínica (...)’.
4. O enunciado: “comecei a me dar conta de que ninguém da clínica queria falar comigo” (**5º parágrafo**) poderia ser proposto, de modo a atender tanto aos sentidos originais quanto às normas de regência, como: ‘acabei de perceber por que ninguém da clínica queria falar comigo’.

**Estão CORRETAS, apenas:**

- A) 1, 2 e 3.  
 B) 1 e 3.  
 C) 2 e 3.  
 D) 2 e 4.  
 E) 3 e 4.

**10. Assinale a alternativa em que ambos os termos estão grafados segundo as normas ortográficas vigentes.**

- A) raíz – raízes  
 B) eficiência – eficiente  
 C) enxaguar – exelência  
 D) corresponsável – coparticipante  
 E) mini-auditório – autodestrutível

## CONHECIMENTOS DO SUS

## 11. Sobre os conteúdos das Leis Orgânicas da Saúde (LOS), analise os itens abaixo:

- I. As Conferências de Saúde são responsáveis pela fiscalização da implementação e utilização dos recursos financeiros a serem aplicados no SUS de cada estado e município.
- II. Determinam sobre a transferência regular e automática de recursos do Governo Federal para Estados e Municípios e Distrito Federal.
- III. Na Lei 8.080/90, a saúde também aparece relacionada a fatores *Determinantes e Condicionantes*, que são os fatores os quais condicionam e determinam a saúde.
- IV. Está prevista na LOS a participação da comunidade na gestão do SUS.

## Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos estão corretos.
- B) Todos estão incorretos.
- C) Apenas um está incorreto.
- D) Apenas dois estão incorretos.
- E) Apenas um está correto.

## 12. Em relação à NOAS, analise as afirmativas abaixo:

- I. Instituiu a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada e define como áreas de atuação estratégicas mínimas para a habilitação nessa condição o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão arterial, o controle da diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde da mulher e a saúde bucal.
- II. Definiu um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência intermunicipal, com acesso garantido a toda a população no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais módulos assistenciais.
- III. Também definiu que o Módulo Assistencial é o espaço territorial, que disponha da resolutividade correspondente ao primeiro nível de referência, podendo ser constituído por um ou mais municípios, com área de abrangência mínima a ser estabelecida para cada Unidade Federada.

## Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas estão corretas.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas uma está incorreta.
- D) Apenas duas estão incorretas.
- E) Apenas uma está correta.

## 13. A partir dessa Lei, observa-se que algumas das atribuições do SUS são: Assistência terapêutica integral; Assistência farmacêutica; Controle e fiscalização de alimentos, água e bebidas, garantindo orientação familiar; Participação na preparação de recursos humanos, dentre outras. Em qual das LOS estão dispostas essas atribuições?

- A) 8.080/90
- B) 8.142/90
- C) NOAS
- D) Constituição Federal de 1988
- E) Diretrizes para a regulação do SUS

## 14. Sobre a Política Nacional da Saúde do Idoso, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- ( ) O perfil epidemiológico da população idosa é caracterizado pela tripla carga de doenças com forte predomínio das condições crônicas, prevalência de elevada mortalidade e morbidade por condições agudas decorrentes de causas externas e agudizações de condições crônicas.
- ( ) A transição demográfica brasileira apresenta características peculiares e não demonstra grandes desigualdades sociais no processo de envelhecimento.
- ( ) A Atenção secundária apresenta-se como ordenadora do cuidado do idoso e deve considerar as especificidades desse grupo populacional a partir de sua capacidade funcional.

## Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) F-V-V
- C) V-V-F
- D) F-F-V
- E) V-F-F

15. O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, é responsável pela implementação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem como principais diretrizes, EXCETO:

- A) Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa.  
 B) Estímulo às ações intersetoriais.  
 C) Busca ativa de lesões neoplásicas do sistema digestivo.  
 D) Incentivo a estudos e pesquisas.  
 E) Fortalecimento do controle social.

16. Vários são os indicadores de saúde utilizados no Brasil. Dos apresentados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o único indicador que NÃO é controlado no país.

- A) Taxa de incidência de sífilis congênita  
 B) Taxa de cobertura vacinal para idosos  
 C) Proporção de exodontia em relação aos procedimentos  
 D) Proporção de parto normal  
 E) Proporção de óbitos em menores de 15 anos que usaram Unidades de Terapia Intensiva

17. Ainda sobre a epidemia da AIDS no Brasil, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Desde o início da epidemia de AIDS (1980) até 31 de dezembro de 2017, foram notificados, no Brasil, 327.655 óbitos, tendo o HIV/ AIDS como causa básica (CID10: B20 a B24).  
 A maior proporção desses óbitos ocorreu na região Sudeste (58,9%).  
 No período de 2007 a 2017, verificou-se uma queda de 14,8% no coeficiente de mortalidade padronizado para o Brasil, que passou de 5,6 para 4,8 óbitos por 100 mil habitantes.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V                      B) F-V-V                      C) V-V-F                      D) F-F-V                      E) V-F-V

18. De acordo com o Manual Integrado de Vigilância Epidemiológica da Cólera editado pelo Ministério da Saúde em 2010, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- A acidez gástrica constitui a primeira linha de defesa do hospedeiro contra a cólera.  
 Após uma importante diminuição do número de casos de cólera no País, a partir de 1995, observou-se, em 1999, um recrudescimento da epidemia, tendência que não se confirmou no ano de 2000, com o registro de 733 casos, todos procedentes da Região Nordeste, em sua maioria dos estados de Pernambuco e Alagoas.  
 O *Vibrio cholerae* não desaparece rapidamente das fezes dos doentes e dos portadores saudáveis, e, em geral, continua sendo eliminado ao término de 100 dias.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V                      B) F-V-V                      C) V-V-F                      D) F-F-V                      E) V-F-V

19. O tétano acidental é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo *Clostridium tetani*, que provoca um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo:

- I. O *Clostridium tetani* é encontrado na natureza, sob a forma de esporo, podendo ser identificado na pele, na terra, em galhos, arbustos, águas putrefatas, poeira das ruas, trato intestinal e fezes (especialmente do cavalo e do homem, sem causar doença).  
 II. A infecção ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e das mucosas.  
 III. Uma característica importante da situação epidemiológica do tétano acidental no Brasil é um aumento na ocorrência de casos em zona rural de residência, fato observado desde a década de 1990, o que pode ser atribuído ao êxodo urbano.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos estão corretos.  
 B) Todos estão incorretos.  
 C) Apenas I e III estão corretos.  
 D) Apenas III está incorreto.  
 E) Apenas I e II estão incorretos.

20. Sobre as Doenças de Notificação Compulsória, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- ( ) A notificação imediata será realizada por telefone como meio de comunicação ao serviço de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.
- ( ) Na impossibilidade de comunicação à SMS, a notificação será realizada à Secretaria de Vigilância a Saúde do Ministério da Saúde, cabendo a esta instituição disponibilizar e divulgar amplamente o número junto aos estados e municípios.
- ( ) A notificação imediata realizada pelos meios de comunicação isenta o profissional ou serviço de saúde de realizar o registro dessa notificação nos instrumentos estabelecidos.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.                      B) F-V-V                      C) V-V-F                      D) F-F-V                      E) V-F-F.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. A medida dos Sinais Vitais (SSVV) fornece dados para determinar o estado de saúde do paciente. Sobre SSVV, é CORRETO afirmar que

- A) a verificação da temperatura retal está indicada para pacientes que apresentam patologias retais e para aqueles em pós-operatório de cirurgia do reto.
- B) a ansiedade aumenta a frequência e a profundidade da respiração como resultado da estimulação simpática.
- C) ao verificar os SSVV de um paciente da enfermaria de clínica médica, o Técnico de Enfermagem classifica como hipertensão estágio 3 a PA= 140x90 mmHg.
- D) acontece bradicardia quando a frequência do pulso, no adulto, está abaixo de 90 bat/min.
- E) a hipertermia é caracterizada, quando a temperatura corporal está entre 35,5 e 37°C.

22. A pressão arterial deve ser medida em toda avaliação de saúde por profissionais de saúde habilitados para realizar o procedimento.

Sobre a técnica de verificação da PA, leia as afirmações abaixo:

- I.** Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia antes da medida.
- II.** Localizar a artéria subclávia e insuflar o manguito até atingir 220 mmHg.
- III.** A largura da bolsa do manguito de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço, e seu comprimento, envolver, pelo menos, 80% do braço.
- IV.** Inflar rapidamente de 20 em 20 mmHg, até o nível estimado da pressão arterial.

Estão CORRETAS, apenas,

- A) I e II.                      B) II e III.                      C) I e III.                      D) I e IV.                      E) II, III e IV.

23. M.H.K, 65 anos internado na clínica médica de um hospital geral, apresenta sangramento intestinal. Está indicada a realização da uma lavagem intestinal. O Enfermeiro solicita ao Técnico de Enfermagem que posicione o paciente para procedimento.

O paciente deve ser colocado na seguinte posição:

- A) Genupeitoral.                      B) Fowler.                      C) Ginecológica.                      D) Sims.                      E) Trendelenburg.

24. Sobre crioterapia, assinale a alternativa CORRETA.

- A) É indicada em lesões abertas e feridas cirúrgicas.
- B) É indicada nos pacientes com estase circulatória, desnutrição ou debilidade acentuada.
- C) Aumenta a circulação no local da aplicação, fazendo vasodilatação periférica.
- D) Estanca hemorragia e reduz congestão e processos inflamatórios.
- E) É indicada em luxações e contusões após 48 horas do ocorrido.

**25. Sobre a coleta de material para exames, leia as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) A coleta de sangue é realizada antes do jejum, exige jejum de 12 horas e é feita por meio de venopunção e colocada em recipiente apropriado, de acordo com o tipo de exame.
- ( ) Na coleta de urina para sedimento quantitativo, é necessário orientar higiene prévia dos genitais externos, desprezar o primeiro jato de urina e coletar o jato na urina em recipiente limpo e seco.
- ( ) Para análise de glicosúria e cetonúria, imergir a fita reagente na urina, imediatamente após a micção, aguardar 60 minutos e comparar com o padrão definido no rótulo do frasco, no tempo estipulado pelo fabricante.
- ( ) Na coleta de escarro, orienta-se ao paciente inspirar profundamente, tossir vigorosamente e coletar, apenas, o escarro dentro do recipiente, devendo ser realizada preferencialmente, no período da manhã, antes da higiene oral e do jejum.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F-V-F-V                      B) F-F-F-V                      C) V-F-V-F                      D) V-V-V-V                      E) F-V-F-F

**26. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental, para corrigir e atenuar deficiência de oxigênio ou hipóxia.****Quanto a esse procedimento, é CORRETO afirmar que**

- A) para definir o aparelho de oxigenação utilizado, deve-se levar em conta a idade do paciente.
- B) os sistemas de baixo fluxo fornecem oxigênio suplementar diretamente às vias aéreas com fluxos de até 6 l/min ou menos.
- C) os sistemas de alto fluxo fornecem, através dos dispositivos de cânula nasal e cateter nasal, uma concentração de oxigênio que será diluído com o ar, resultando numa FiO<sub>2</sub> baixa e variável.
- D) a cânula nasal é um dispositivo fácil de ser instalado, fornece oxigênio em concentrações razoáveis, não sendo necessário utilizar umidificador no momento da sua utilização.
- E) a máscara de Venturi é um dispositivo confortável para o paciente, entretanto fornece ao paciente concentrações baixas de oxigênio, não sendo, dessa forma, recomendável o seu uso.

**27. A lavagem intestinal ou enema consiste na instilação de uma solução dentro do reto e do cólon sigmoide. Quanto à função e indicação para a realização desse procedimento, é CORRETO afirmar que**

- A) é utilizada para a remoção de fezes impactadas.
- B) não pode ser utilizada como veículo para administração de medicamentos.
- C) promove a defecação por impedir a peristalse intestinal.
- D) não deve ser utilizada para remoção das fezes antes de exames ou procedimentos cirúrgicos, devido à possibilidade de irritação da mucosa intestinal.
- E) é utilizada como a principal ferramenta no controle e prevenção da constipação intestinal.

**28. Sobre administração de medicamentos, leia atentamente as afirmativas abaixo:**

- I.** A via parenteral tem como desvantagem absorção imediata e ação rápida: o medicamento sofre ação do suco gástrico em condições especiais, alta complexidade no manejo e na aplicação.
- II.** Na via intratecal, os medicamentos são injetados diretamente no espaço subaracnoideo ou peridural.
- III.** Antes de usar material esterilizado, certifique-se das características e das dimensões do material a ser utilizado, conferir data de validade e a integridade da embalagem.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e II, apenas.                      B) I e III, apenas.                      C) II e III, apenas.                      D) I, apenas.                      E) I, II e III.

**29. Os curativos são um meio terapêutico, que consiste na limpeza e na aplicação de uma cobertura estéril em uma ferida. Eles têm a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação ou infecções.****Partindo dessa premissa, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A assepsia é o conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo.
- II.** A antisepsia é a utilização de produtos (bactericidas ou bacteriostáticos) sobre a pele ou mucosa, com o objetivo de reduzir os microorganismos em sua superfície.





**33. Sobre a assistência de enfermagem na atenção ao adolescente no âmbito hospitalar, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- Ao entrar no hospital, o adolescente, particularmente, passa por diversas mudanças em sua rotina que vão interferir na sua adaptação.
- Os adolescentes apresentam vulnerabilidades em relação à população em geral, devido aos diversos fatores inerentes a essa fase da vida, como o crescimento físico, cognitivo e social.
- Durante a hospitalização do adolescente, o cuidado de Enfermagem implica uma responsabilidade emocional e social envolvente e humanizante que permita identificar todas as necessidades do adolescente e da sua respectiva família.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) F-F-V                      B) F-V-F                      C) F-V-V                      D) V-V-V                      E) V-V-F

**34. Sobre vacinas na gestação, leia as afirmações e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- A vacina antitetânica (dT) protege contra o tétano apenas o bebê. Se a gestante nunca foi vacinada, deve iniciar a vacinação o mais precocemente.
- A vacina dTpa protege a mãe e o bebê contra o tétano, difteria e coqueluche e deverá ser tomada entre a 27ª e a 36ª semana de gestação.
- A vacina contra a hepatite B, caso a mãe não seja vacinada, deve ser administrada em três doses para a gestante ficar protegida.
- A vacina contra gripe (influenza) não é recomendada para as gestantes nem para a mulher após o parto.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) F-F-V-V                      B) F-V-F-V                      C) V-V-V-F                      D) V-V-F-F                      E) F-V-V-F

**35. A Hipertensão Arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial, caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos sistólicos e diastólicos. Sobre HA, leia as afirmações abaixo:**

- I.** O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco para HA, associado a eventos cardiovascular e renal.
- II.** O consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas não interfere nos níveis pressóricos.
- III.** Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HA englobam políticas públicas de saúde combinadas com ações das sociedades médicas e dos meios de comunicação. O objetivo dessas estratégias deve ser estimular o diagnóstico precoce.
- IV.** A hipertensão do avental branco (HAB) e a hipertensão mascarada (HM) são comuns na gravidez, e, por isso, a monitorização ambulatorial da pressão arterial pode ser um método útil na decisão clínica.

**Estão CORRETAS, apenas,**

- A) I, III e IV.                      B) II, III e IV.                      C) I e IV.                      D) II e III.                      E) II e IV.

**36. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta, prioritariamente, os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Trata-se de um problema de saúde prioritário no Brasil. Quanto a essa patologia, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** O principal reservatório são os morcegos.
- II.** É uma doença de transmissão aérea, que ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea.
- III.** A transmissão pode ocorrer enquanto o indivíduo estiver eliminando bacilos no escarro, período identificado pela baciloscopia de escarro positiva.
- IV.** As pessoas privadas de liberdade, pessoas que vivem com HIV/aids e pessoas em situação de rua, têm maior risco de adoecimento por tuberculose.

**Estão CORRETAS, apenas,**

- A) I, II e III.                      B) I, III e IV.                      C) I e IV.                      D) II, III e IV.                      E) I e III.

**37. O Diabetes Mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico, caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. Vem sendo considerado grave problema de saúde pública.**

**Quanto ao diabetes mellitus tipo 2 (DM 2), é CORRETO afirmar que**

- A) a presença de dormência nas extremidades, acompanhada de dor abdominal de moderada a intensa, é um sinal importante do início insidioso da patologia.
- B) a maior prevalência do DM 2 ocorre na infância e adolescência, até a segunda década de vida.
- C) os casos persistentes de hipotensão arterial podem ser um sinal indicativo da necessidade de se iniciar o rastreamento da patologia.
- D) a presença de retenção urinária, o aparecimento de edema de extremidades, a urgência de urinar e disúria são sintomas comuns.
- E) a obesidade é um fator predisponente para o desenvolvimento da doença, principalmente quando existe acúmulo de gordura abdominal ou centrípeta.

**38. Sobre Acidente Vascular Encefálico (AVE), analise as afirmativas abaixo:**

- I. O AVE isquêmico geralmente ocorre devido à oclusão de uma artéria para uma determinada região do cérebro.
- II. Podem ser considerados como fator de risco para o AVE fatores não modificáveis: idade, sexo, raça e hereditariedade; fatores modificáveis: hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, tabagismo, alcoolismo e sedentarismo.
- III. São intervenções de enfermagem no AVE: realizar avaliação neurológica, manter o corpo e a cabeça do paciente alinhados à cabeceira elevada em 30 graus, monitorar a frequência e o ritmo cardíaco.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I, II e III.

**39. A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essa infecção frente aos acidentes ocupacionais com material biológico e em outros tipos de exposição.**

**Sobre esse tipo de profilaxia, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Urina, fezes e vômitos são materiais biológicos com risco de transmissão do HIV.
- B) A exposição cutânea, exclusivamente quando a pele exposta se encontra íntegra, apresenta risco de transmissão do HIV.
- C) A PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite as 72 horas subsequentes à exposição.
- D) A indicação da PEP independe do status sorológico para HIV da pessoa exposta.
- E) O atendimento da pessoa exposta só é feito mediante o resultado do teste rápido para HIV da pessoa-fonte.

**40. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. Quando se apresenta na forma de doença invasiva, caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais frequente delas e a meningococemia, a forma mais grave.**

**Sobre essa doença, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A forma de transmissão se dá através de contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes.
- B) O grupo etário de maior risco são as crianças maiores de 5 anos, principalmente a partir de 10 anos.
- C) A coleta de LCR e sangue para o diagnóstico laboratorial da doença meningocócica deve ser realizada só após o início do tratamento com antibiótico.
- D) É recomendada a quimioprofilaxia para todos os profissionais de saúde que atenderam o caso de doença meningocócica.
- E) A vacinação de bloqueio está indicada para todos os contatos próximos ao caso de doença meningocócica.

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**